ООО «Промветсервис»
Республика Беларусь,
220034, г. Минск, ул. З. Бядули, 12/2а
тел./факс 8017 503-53-67
info@promvs.by

КАТАЛОГ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ

2022



ПРОМВЕТСЕРВИС

СОДЕРЖАНИЕ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ОРАЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ

Доксикол Аква 4
Колимиксин 5
Леволокс 6
Леволокс 20% 7
Норфлок Аква 8
Пульмонол СТ 9
Резовет 10
Ресэйв 11
Сульфаприм 12
Сульфаприм 36% 13
Тилмитрим 14
Трифлокс 15
Флосан 4% 16
Флосол 30% 17
Фосфолекс 18
Фосфотрим Плюс OR 19
Ципромет 20
Ципрофлокс 21
Энрокол 22
Энроксол 23

ОРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ

Айвазол 24
Амоксикар 50% 25
Амоксикар 80% 26
Амоксикол АЛ 27
Вирджин 110 28
Вирджин 500 29
Гентан WS 20% 30
Доксикар 31
Клавумокс 62,5% 32
Клоксамокс 33
Леволокс порошок 34
Линспект 44 35
Линспект 100 36
Норфлотинат 37
Стрептомицидин 38
Суперфос PR 39
Сульфаприм порошок 40
Тетрасепт 41
Тиамутин WS 42
Тилмитрим порошок 43
Тифарм 44
Энрокс-80 45
Энрастим 46
Фенокситил 10% 47
Фенокситил 32,5% 48

ИНЪЕКЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ

Азалицин 49
Амоксол LA 50
Вирусид 51
Гамитрон 52
Гентан 4% 53
Гентан 10% 54
Доксифлокс 55
Драксон 56
Левит 50 57
Левит 100 58
Левовирин 59
Линкомицин 10% 60
Марбофлоксацин 2% 61
Марбофлоксацин 10% 62
Метасульф 63
Микозин 64
Респирон 65
Респирон Пиг 66
Специн ЛА 67
Тиамол 68
Тиам-тил 69
Тилостин 70
Флоринол 71
Флоритил 72
Фтормакс 73
Фосфотрим Плюс 74
Цефапик LA 75
Цефкинол 2,5% 76
Цефкинол 7,5% 77
Цефтофур 5% 78
Энрамокс 79

СУСПЕНЗИИ ДЛЯ ИНТРАЦИСТЕРНАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ

Мастикур LC 80
Ультрамаст 81
Цефкином DC 82
Цефкином LC 83

ВНУТРИМАТОЧНЫЕ РАСТВОРЫ

Эндовазол 85
Эндолекс 86
Эндовит 87
Эндоген 88
Эндотрим 89
Эндойодол 90

ПРОМВЕТСЕРВИС

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ОРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ

Аспирон 92

ИНЪЕКЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ

Контрапаин-10 93
Кетопрофен Лонг 94
Мелоксидин 95
Пиралгон 96

ОРАЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ

Парацетамол 30% 97

ОРАЛЬНЫЕ СУСПЕНЗИИ

Неболин-вет 98

АНТИПРОТОЗОЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, КОКЦИДИОСТАТИКИ

ОРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ

Эймосан 100

ОРАЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ

Галофур 101
Прококс 102
Толутрокс 2,5% 103
Толутрокс 5% 104

АНТИГЕЛЬМИНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ИНЪЕКЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ

Дормек 106
Левамизол 7,5% 107

ОРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ

Альбендазим 10% 108
Альбендазим 20% 109
Левамизол 100 110
Фенбекс 22,2% 111

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ИНЪЕКЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ

Бусерол 113
Гонадерил 114
Дексамет 115
Окситон 116
Преднизол 25 117
Элеопрост D 118
Эстровет DL 119

ВИТАМИНЫ И ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

ИНЪЕКЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ

Визел 121
Користар 122
Феррум+B_{12} 123
Феррум 200 124

ОРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ

Старт Альб 125

ОРАЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ

Селевит Е 126

РАСТВОРЫ ДЛЯ ИНФУЗИЙ

ИНЪЕКЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ

Раствор глюкозы 5% 128
Раствор глюкозы 40% 129
Раствор натрия хлорида 0,9% 130

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ИНЪЕКЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ

Коронакэт 132

РОДЕНТИЦИДНЫЕ СРЕДСТВА

Комбицид Нео 134

ПРОМВЕТСЕРВИС

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ОРАЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ

Доксикол Аква 4
Колимиксин 5
Леволокс 6
Леволокс 20% 7
Норфлок Аква 8
Пульмонол СТ 9
Резовет 10
Ресэйв 11
Сульфаприм 12
Сульфаприм 36% 13
Тилмитрим 14
Трифлокс 15
Флосан 4% 16
Флосол 30% 17
Фосфолекс 18
Фосфотрим Плюс OR 19
Ципромет 20
Ципрофлокс 21
Энрокол 22
Энроксол 23

ОРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ

Айвазол 24
Амоксикар 50% 25
Амоксикар 80% 26
Амоксикол АЛ 27
Вирджин 110 28
Вирджин 500 29
Гентан WS 20% 30
Доксикар 31
Клавумокс 62,5% 32
Клоксамокс 33
Леволокс порошок 34
Линспект 44 35
Линспект 100 36
Норфлотинат 37
Стрептомицидин 38
Суперфос PR 39
Сульфаприм порошок 40
Тетрасепт 41
Тиамутин WS 42
Тилмитрим порошок 43
Тифарм 44
Энрокс-80 45
Энрастим 46
Фенокситил 10% 47
Фенокситил 32,5% 48

ИНЪЕКЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ

Азалицин 49
Амоксол LA 50
Вирусид 51
Гамитрон 52
Гентан 4% 53
Гентан 10% 54
Доксифлокс 55
Драксон 56
Левит 50 57
Левит 100 58
Левовирин 59
Линкомицин 10% 60
Марбофлоксацин 2% 61
Марбофлоксацин 10% 62
Метасульф 63
Микозин 64
Респирон 65
Респирон Пиг 66
Специн ЛА 67
Тиамол 68
Тиам-тил 69
Тилостин 70
Флоринол 71
Флоритил 72
Фтормакс 73
Фосфотрим Плюс 74
Цефапик LA 75
Цефкинол 2,5% 76
Цефкинол 7,5% 77
Цефтофур 5% 78
Энрамокс 79

СУСПЕНЗИИ ДЛЯ ИНТРАЦИСТЕРНАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ

Мастикур LC 80
Ультрамаст 81
Цефкином DC 82
Цефкином LC 83

ПРОМВЕТСЕРВИС

ДОКСИКОЛ АКВА

Doxycolum aqua



Комплексный антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 200 мг доксициклина гиклата (гидрохлорида) и 1000000 МЕ колистина сульфата.

Препарат выпускают в полимерных флаконах по 20, 100, 500, 1000 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Доксициклина гиклат – антибиотик группы тетрациклинов, производное окситетрациклина. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, *Chlamydia spp.*, *Rickettsia spp.*, *Mycoplasma spp.*

Колистина сульфат – смесь сульфатных полипептидов, продуцируемых некоторыми штаммами *Bacillus polymyxa*. Активен в отношении большинства аэробных грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Escherichia coli*, *Klebsiella spp.*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Bordetella spp.*, *Proteus spp.* и некоторых других.

ПОКАЗАНИЯ

Доксикол аква применяют телятам, свиньям и сельскохозяйственной птице при колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, микоплазмозе и других инфекционных заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к доксициклину и колистину, сопровождающихся поражением желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и мочеполовых путей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат назначают в следующих дозах:

- *птице (цыплятам-бройлерам, индейкам, гусям):* 0,1-0,2 мл на 1 кг массы тела птицы (при индивидуальной даче) или 500 мл на 1000 л воды групповым методом в течение 3-5 дней. Птице раствор препарата готовят из расчета потребности в воде на одни сутки. В период лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат. При необходимости курс лечения повторяют через 5 дней;
- *свиньям:* 1000-1500 мл на 1000 л питьевой воды в течение 3-5 дней. При индивидуальной даче препарат применяют в дозе 0,5-1,0 мл на 10 кг массы тела животного два раза в сутки в течение 3-5 дней;
- *телятам до 6-месячного возраста:* 0,5-1,0 мл на 10 кг массы тела животного два раза в сутки в течение 3-5 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять препарат птице, чье яйцо используется в пищу людям, и ремонтному молодняку кур позднее 20 дней до начала яйцекладки.

Не рекомендуется применение препарата жвачным животным старше 6-месячного возраста.

Препарат противопоказан при нарушениях функции почек и печени.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками групп макролидов, тетрациклина, нестероидными противовоспалительными средствами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных и птицы – 20 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

КОЛИМИКСИН

Colimixinum



Антибактериальный препарат, обладающий бактерицидным действием в отношении большинства аэробных грамотрицательных микроорганизмов

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 4000000 МЕ колистина сульфата.
Препарат выпускают в полимерных флаконах по 100, 1000 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Колистина сульфат – смесь сульфатных полипептидов, продуцируемых некоторыми штаммами *Bacillus polymyxa*. Активен в отношении большинства аэробных грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Escherichia coli*, *Klebsiella spp.*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Bordetella spp.*, *Proteus spp.* и некоторых других.

ПОКАЗАНИЯ

Колимиксин применяют свиньям, телятам и сельскохозяйственной птице при колибактериозе, сальмонеллезе, энтероколитах, гастроэнтероколитах и при других заболеваниях, вызванных грамотрицательными бактериями.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах:

- *сельскохозяйственной птице*: 0,2 мл на 10 кг массы тела птицы или 200-250 мл на 2000 л питьевой воды один раз в день групповым методом в течение 3-5 дней. Птице раствор препарата готовят из расчета потребности в воде на одни сутки. В период лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат.
- *свиньям*: 0,10-0,15 мл на 10 кг массы тела животного 1-2 раза в сутки в течение 3-5 дней с питьевой водой (разводят в соотношении 1 : 10). При тяжелой форме заболевания дозу препарата увеличивают до 0,2 мл на 10 кг массы тела животного.

При групповой даче перед применением препарат разводят из расчета 0,3 л препарата на 1000 л питьевой воды.

- *телятам:* 0,10-0,25 мл на 10 кг массы тела животного 1-2 раза в день в течение 3-5 дней с питьевой водой (разводят в соотношении 1 : 10).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять препарат животным с повышенной чувствительностью к полипептидам, а также животным с поражениями почек, жвачным животным старше трехмесячного возраста.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не рекомендуется применять препарат с аминогликозидными антибиотиками, ампициллином, цефалоспоринами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных и птицы – 7 суток. Яйцо – без ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

ЛЕВОЛОКС

Levoloxum

Антибактериальный препарат широкого спектра действия



СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 100 мг левофлоксацина (в форме левофлоксацина гемигидрата).

Препарат выпускают в полимерных флаконах по 20, 100, 500, 1000 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Левофлоксацин – антибиотик группы фторхинолонов. Активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов , в том числе *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella spp.*, *Escherichia coli*, *Enterobacter spp.*, *Campylobacter spp.*, *Salmonella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Proteus spp.*, *Chlamydia spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Mycoplasma spp.*, *Mycobacterium spp.* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Леволокс применяют свиньям и птице при колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, гемофилезе, микоплазмозе, стафилококкозе и других инфекционных заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к левофлоксацину.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат назначают в следующих дозах:

- *свиньям:* 5-7,5 мг левофлоксацина на 1 кг массы тела животного или 0,5 л препарата на 1000 л питьевой воды в течение 2-5 дней;
- *птице:* 1-1,5 мл препарата на 20 кг массы тела птицы (5-7,5 мг левофлоксацина на 1 кг массы тела птицы) или 0,5 л препарата на 1000 л питьевой воды в течение 3-5 дней. Птице раствор препарата готовят из расчета потребности в воде на одни сутки. В период лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат противопоказан при нарушениях функции почек, печени, повышенной чувствительности к фторхинолонам.

Запрещается применять курам-несушкам и ремонтному молодняку кур позднее 14 дней до начала яйцекладки, поросятам массой менее 20 кг, супоросным и подсосным свиноматкам.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Противопоказано совместное применение препарата с бактериостатическими антибиотиками (тетрациклинами, макролидами и амфениколами), теофилином, стероидами, непрямыми антикоагулянтами.

Прием совместно с железосодержащими лекарственными средствами, сукральфатом и антацидными лекарственными средствами, содержащими магний, кальций и алюминий, приводит к снижению всасывания фторхинолонов, поэтому его следует назначать за 1-2 часа до или через 4 часа после приема вышеуказанных лекарственных средств.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 9 дней. Мясо птицы – 7 дней.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

При хранении при низких температурах (от +5 °С до +15 °С) допускается повышение вязкости препарата, которое исчезает при повышении температуры (от +15 °С до +25 °С) в течение 2-3 часов.

ЛЕВОЛОКС 20%

Levoloxum 20%



Антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 200 мг левофлоксацина (в виде левофлоксацина гемигидрата).

Препарат выпускают в полимерных флаконах по 20, 100, 500, 1000, 5000 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Левофлоксацин – антибиотик группы фторхинолонов. Активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp., Escherichia coli, Enterobacter spp., Campylobacter spp., Salmonella spp., Haemophilus spp., Proteus spp., Chlamydia spp., Staphylococcus spp., Mycoplasma spp., Mycobacterium spp.* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Леволокс 20% применяют свиньям и сельскохозяйственной птице при колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, гемофилезе, микоплазмозе, стафилококкозе и других инфекционных заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к левофлоксацину.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах:

- *свиньям:* 0,5-0,75 л препарата на 2000 л питьевой воды в течение 3-5 дней (5-7,5 мг левофлоксацина на 1 кг массы тела животного);
- *сельскохозяйственной птице (цыплятам-бройлерам, курам-несушкам, ремонтному молодняку, племенной птице):* 0,5 л препарата на 2000 л питьевой воды в течение 3-5 дней (7,5 мг левофлоксацина на 1 кг массы тела птицы).

Птице раствор препарата готовят из расчета потребности в воде на одни сутки. В период лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат.

При необходимости курс лечения повторяют через 5 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять препарат супоросным и подсосным свиноматкам, поросятам массой менее 20 кг, курам-несушкам и ремонтному молодняку кур менее чем за 14 дней до начала яйцекладки, в связи с накоплением левофлоксацина в яйце.

Запрещается применять препарат животным при нарушениях функции почек, печени, повышенной чувствительности животных к компонентам препарата.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Противопоказано совместное применение препарата с бактериостатическими антибиотиками (тетрациклинами, макролидами и амфениколами), теофилином, стероидами, непрямыми антикоагулянтами.

Прием совместно с железосодержащими лекарственными средствами, сукральфатом и антацидными лекарственными средствами, содержащими магний, кальций и алюминий, приводит к снижению всасывания фторхинолонов, поэтому его следует назначать за 1-2 часа до или через 4 часа после приема вышеуказанных лекарственных средств.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо свиней – 9 суток. Мясо птицы – 7 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

НОРФЛОК АКВА

Norfloc Aqua



Антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 200 мг норфлоксацина.
Препарат выпускают в полимерных флаконах по 20, 100, 500, 1000 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Норфлоксацин – антибиотик группы фторхинолонов. Активен в отношении грамположительных бактерий, таких как *Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp., Clostridium spp. u Listeria monocytogenes* и грамотрицательных бактерий, таких как *Escherichia coli, Salmonella spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Haemophilus spp., Pasteurella multocida, Pseudomonas spp., Brucella spp., Campylobacter spp.*, а также *Mycoplasma spp.*

ПОКАЗАНИЯ

Норфлок Аква применяют молодняку крупного и мелкого рогатого скота, свиньям, птице при респираторных заболеваниях (пневмонии, бронхопневмонии), колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, микоплазмозе, инфекционных патологиях, связанных с поражением мочеполовой системы и некоторых других заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к норфлоксацину.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах:

- *телятам, ягнятам, козлятам (только в период кормления молоком):* 1,0 мл препарата на 15 кг массы тела животного, 1 раз в день в течение 3-5 дней (с питьевой водой, молоком или обратом);
- *свиньям:* 50 мл препарата на 150 л питьевой воды (при групповой даче) или 1,0 мл препарата на 15 кг массы тела животного (при индивидуальной даче), 1 раз в сутки в течение 3-5 дней;
- *птице:* 100-120 мл препарата на 400 л питьевой воды, в течение 3-5 дней.

При необходимости курс лечения повторяют через 5 дней. Птице раствор готовят из расчета потребности в воде на одни сутки. Во время лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат противопоказан при нарушениях функции почек, печени, повышенной чувствительности к фторхинолонам, беременности.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками групп макролидов, тетрациклина, амфениколами; нестероидными противовоспалительными средствами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 14 дней. Мясо птицы – 12 дней. Яйцо – 7 дней.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

ПУЛЬМОНОЛ СТ

Pulmonolum ST



Антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 250 мг тилмикозина.

Препарат выпускают в полимерных флаконах по 20, 100, 250, 500, 1000 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тилмикозин – полусинтетический антибиотик из группы макролидов.

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе *Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Haemophilus spp., Ornithobacterium rhinotracheale, Corynebacterium spp., Actinobacillus pleuropneumoniae,* а также *Actinomyces spp., Mycoplasma spp. (Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma bovis, Mycoplasma dispar)* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Пульмонол СТ применяют сельскохозяйственной птице, свиньям, телятам при микоплазмозе, пастереллезе, атрофическом рините, актинобациллярной плевропневмании, гемофилезе, орнитобактериозе и других инфекционных заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к тилмикозину.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат назначают в следующих дозах:

- *телятам:* 0,25-0,5 мл препарата на 10 кг массы тела животного (12,5 мг тилмикозина на 1 кг массы тела животного) 1-2 раза в день в течение 3-5 дней. Препарат применяют индивидуально с питьевой водой или молоком. Лечебный раствор готовят ежедневно;
- *свиньям:* 80 мл препарата на 100 л питьевой воды в течение 3-5 дней (поросятам препарат применяется с питьевой водой, молоком или заменителем цельного молока);
- *сельскохозяйственной птице (цыплятам-бройлерам и племенной птице):* 300 мл препарата на 1000 л питьевой воды в течение 3-5 дней.

Препарат применяют птице и свиньям индивидуально или групповым способом, суточная доза 15-20 мг тилмикозина на 1 кг массы тела животного/птицы.

Птице, свиньям раствор готовят из расчета потребности в воде на одни сутки. Во время лечения птица, свиньи должны получать только воду, содержащую препарат.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не рекомендуется животным, имеющим индивидуальную чувствительность к макролидам.

Запрещается применять препарат птице, чье яйцо используется в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не рекомендуется одновременное применение с препаратами из групп пенициллина и цефалоспорина.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо свиней – 16 дней. Мясо птицы – 16 дней. Мясо телят – 42 дня.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

РЕЗОВЕТ

Resovetum



Антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1 мл препарата содержится 15 мг резорцина (в форме резорциновых липидов).

Препарат выпускают в полимерных флаконах (канистрах) по 100, 500, 1000, 2000, 5000 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Резорцин (резорциновые липиды), обладают широким спектром антибактериального действия в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе: *Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysagalactiae, Streptococcus uberis, Klebsiella spp., Arcanobacterium pyogenes, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa.*

ПОКАЗАНИЯ

Резовет применяют для лечения птицы при гемофилезе, колибактериозе, микоплазмозе, пастереллезе, некротическом энтерите, пуллорозе, сальмонеллезе.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат назначают в следующих дозах:

- *птице:* 1 л на 1000 л питьевой воды в течение 5-10 суток (групповым или индивидуальным способом).

Птице раствор препарата готовят из расчета потребности в воде на одни сутки. В период лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо птицы, яйца – без ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

РЕСЭЙВ

Reseivum



Антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 100 мг флорфеникола, 50 мг флуниксина (в форме флуниксина меглумин).

Препарат выпускают в полимерных флаконах по 100, 500, 1000 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Флорфеникол – синтетический антибиотик, производное тиамфеникола, в молекуле которого гидроксильная группа замещена атомом фтора.

Активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus spp.*, *Proteus spp.*, *Enterobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Bordetella spp.*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, а также в отношении *Mycoplasma spp.*

Флуниксина меглумин представляет собой нестероидное противовоспалительное средство. Оказывает выраженное анальгезирующее, противовоспалительное, жаропонижающее и антитоксическое действие.

ПОКАЗАНИЯ

Ресэйв применяют свиньям при атрофическом рините, гемофилёзе, актинобациллярной плевропневмонии, вторичных бактериальных инфекциях, а также других заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к флорфениколу.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах:

- *свиньям:* 0,5 мл препарата на 10 кг массы тела животного с питьевой водой в течение 5-7 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещен к применению сельскохозяйственной птице всех возрастных категорий. Запрещается применять препарат свиноматкам в период беременности и лактации, хрякам-производителям.

Запрещается применение препарата при тяжелых поражениях системы кроветворения, печени и почек, а также при повышенной индивидуальной чувствительности животных к компонентам препарата.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Запрещается одновременное использование препарата одновременно с антибиотиками группы пенициллинов, цефалоспоринов, фторхинолонов, амфиколами, ввиду возможного возникновения у животных побочных явлений и осложнений, а также одновременное применение с непрямыми антикоагулянтами, барбитуратами, миорелаксантами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 14 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

СУЛЬФАПРИМ

Sulfaprimum



Комплексный антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 200 мг сульфадиазина натрия и 40 мг триметоприма.

Препарат выпускают в полимерных флаконах по 20, 100, 400, 450, 500, 1000, 5000 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Сульфадиазин натрия – сульфаниламидный препарат.

Триметоприм – химиотерапевтический препарат из группы диаминопиримидинов.

Сульфадиазин и триметоприм обладают синергидным действием.

Препарат активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, таких как *Escherichia coli, Clostridium spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Salmonella spp., Proteus spp., Bacillus anthracis, Pasteurella multocida, Haemophilus spp., Bordetella spp., Campylobacter spp., Mannheimia haemolytica* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Сульфаприм применяют крупному рогатому скоту, овцам, свиньям, кроликам и птице при колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, инфекционных патологиях мочеполовой системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, эймериозе, а также при других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к компонентам препарата.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах:

- *крупному рогатому скоту, овцам, свиньям:* 0,5 мл препарата на 10 кг массы тела животного, с питьевой водой, 1-2 раза в сутки в течение 5- 7 дней;
- *кроликам:* 4 мл препарата на 10 л питьевой воды, 1-2 раза в сутки в течение 5-7 дней;
- *сельскохозяйственной птице:* 400-800 мл на 1000 л питьевой воды (групповым методом) или 0,1-0,15 мл препарата на 1 кг массы тела птицы (при индивидуальной даче), 1-2 раза в сутки в течение 5-7 дней.

Птице раствор препарата готовят из расчета потребности в воде на одни сутки. В период лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат. Возможно выпаивание препарата методом пульс-дозинга в течение 4-6 часов.

При необходимости курс лечения повторяют через 5 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата птице, чьё яйцо используется в пищу людям.

Запрещается использовать препарат лактирующим животным и козам.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не рекомендуется применять в сочетании с препаратами серы и производными парааминобензойной кислоты.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных, птицы - 10 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

СУЛЬФАПРИМ 36%

Sulfaprimum 36%



Комплексный антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 300 мг сульфадимидина (в форме сульфадимидина натрия) и 60 мг триметоприма (в форме триметоприма фенилпропанола дисульфоновой кислоты натриевой соли).

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Сульфадимидин натрия – сульфаниламидный препарат.

Триметоприм – химиотерапевтический препарат из группы диаминопиримидинов.

Сульфадимидин и триметоприм обладают синергидным действием.

Препарат активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, таких как *Escherichia coli, Clostridium spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Salmonella spp., Proteus spp., Bacillus anthracis, Pasteurella multocida, Haemophilus spp., Bordetella spp., Campylobacter spp., Mannheimia haemolytica,* эймерий и других возбудителей, чувствительных к сульфадимидину и триметоприму.

ПОКАЗАНИЯ

Сульфаприм 36% применяют молодняку крупного рогатого скота, свиньям и птице при колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, инфекционных патологиях мочеполовой системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, эймериозе, а также при других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к компонентам препарата.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют с питьевой водой в течение 5-7 дней в следующих дозах:

- *телятам, свиньям:* 1 мл препарата на 6 кг массы тела животного;
- *сельскохозяйственной птице:* 400-650 мл препарата на 1000 л питьевой воды (групповым методом).

Птице раствор препарата готовят из расчета потребности в воде на одни сутки. В период лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат. Возможно выпаивание препарата методом пульс-дозинга в течение 4-6 часов. При необходимости курс лечения повторяют через 5 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять препарат козам, лактирующим и беременным самкам, а также птице, чьё яйцо используют в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Запрещается одновременное применение препарата с препаратами фолиевой кислоты, новокаина, анестезина и других производных параминобензойной кислоты, ввиду их антагонистического взаимодействия.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 10 суток, мясо птиц – 5 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

ТИЛМИТРИМ

Tylmitrimum



Комплексный антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 100 мг тилмикозина, 100 мг энрофлоксацина, 50 мг триметоприма.

Препарат выпускают в полимерных флаконах по 20, 100, 500, 1000 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тилмикозин – антибиотик из группы макролидов.

Энрофлоксацин – антибиотик из группы фторхинолонов.

Триметоприм – химиотерапевтический препарат из группы диаминопиримидинов.

Препарат активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, таких как *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Ornithobacterium rhinotracheale*, *Pasteurella multocida*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Listeria monocytogenes*, *Corynebacterium spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Haemophilus spp.*, *Salmonella spp.*, *Klebsiella spp.* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Тилмитрим применяют сельскохозяйственной птице при колибактериозе, сальмонеллезе, хронических респираторных заболеваниях, стрептококкозе, некротическом энтерите, гемофилезе, микоплазмозе, смешанных инфекциях и вторичных инфекциях при вирусных заболеваниях, возбудители которых чувствительны к тилмикозину, энрофлоксацину и триметоприму.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат назначают в следующих дозах:

- *птице:* 0,5-1 мл препарата на 1 л питьевой воды на протяжении 3 суток.

При микоплазмозе и орнитобактериозе – 1 мл препарата на 1 л питьевой воды в течение первых 3 суток жизни.

Обработку птицы рекомендуется повторить на 20-22 сутки жизни путем выпаивания препарата в течение 3 суток в дозе 0,5-1 мл на 1 л питьевой воды.

В период лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат. Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление птицей в течении суток.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Запрещается применять птице, чье яйцо используется в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Запрещается применение совместно с бактериостатическими антибиотиками (левомицетином, макролидами и тетрациклинами), теофиллином и нестероидными противовоспалительными средствами, препаратами магния и калия.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо птицы – 12 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

ТРИФЛОКС

Trifloxum



Комплексный антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 100 мг энрофлоксацина, 1000000 МЕ колистина сульфата и 50 мг триметоприма.

Препарат выпускают в полимерной упаковке по 20, 100, 1000 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Энрофлоксацин – антибиотик из группы фторхинолонов.

Колистина сульфат – смесь сульфатных полипептидов, продуцируемых некоторыми штаммами *Bacillus polymyxa.*

Триметоприм – химиотерапевтический препарат из группы диаминопиримидинов.

Препарат активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Escherichia coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., Klebsiella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Proteus spp.,* а также *Mycoplasma spp.*

ПОКАЗАНИЯ

Трифлокс применяют свиньям, телятам и сельскохозяйственной птице при колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, энтеритах, микоплазмозе, инфекционном синовите и рините у птицы, бордетеллиозе свиней, стафилококкозе и других инфекционных заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к компонентам препарата.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Трифлокс назначают с водой в следующих дозах:

- *птице:* 0,1 мл на 1 кг массы тела птицы или 1 л на 2000 л питьевой воды 1 раз в день групповым методом в течение 3-5 дней. Птице раствор препарата готовят из расчета потребности в воде на одни сутки. В период лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат;
- *свиньям:* 0,3 мл на 10 кг массы тела животного 1 раз в сутки в течение 3-5 дней. При тяжелой форме заболевания дозу увеличивают до 0,5 мл на 10 кг массы тела животного;
- *телятам:* 0,25-0,5 мл препарата на 10 кг массы тела животного 1-2 раза в день в течение 3-5 дней с молоком или водой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат противопоказан при нарушениях функции почек, печени, повышенной чувствительности к фторхинолонам, колистину и триметоприму.

Запрещается применение препарата птице, чьё яйцо используется в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Противопоказано совместное применение препарата с бактериостатическими антибиотиками (тетрациклинами, макролидами и амфениколами), стероидами, непрямыми антикоагулянтами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо птицы – 12 суток. Мясо свиней и телят – 15 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

ФЛОСАН 4%

Flosanum 4%



Антибактериальный препарат с выраженным противомикробным действием

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 40 мг флорфеникола.

Препарат выпускают в полимерной упаковке по 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Флорфеникол – синтетический антибиотик, производное тиамфеникола. Активен в отношении *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus spp.*, *Proteus spp.*, *Enterobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Bordetella spp.* и др., а также *Mycoplasma spp.*

ПОКАЗАНИЯ

Флосан 4% применяют свиньям при плевропневмонии, атрофическом рините, гемофилезе, микоплазмозе, бордетеллезе и птице при колибактериозе, пастереллезе, микоплазмозе, респираторных заболеваниях и других заболеваниях, вызванных возбудителями, чувствительными к флорфениколу.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат назначают в следующих дозах:

- *свиньям:* 3,75-5 мл препарата на 100 кг массы тела животного с кормом или питьевой водой в течение 5-7 дней;
- *птице (цыплятам-бройлерам, племенным курам, ремонтному молодняку):* 50 мл препарата на 100 кг массы тела птицы с питьевой водой в течение 3-5 дней.

Концентрация действующего вещества не должна превышать 2 г на 1 л питьевой воды (50 мл препарата на 1 л питьевой воды).

Птице раствор готовят из расчета потребности в воде на одни сутки. Во время лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять препарат птице, чье яйцо используется в пищу людям.

Не допускается применение препарата супоросным свиноматкам.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не допускается одновременное применение с другими антибиотиками (амфениколы, пенициллины, цефалоспорины и др.), фторхинолонами, непрямыми антикоагулянтами, барбитуратами, миорелаксантами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо свиней – 14 суток. Мясо птицы – 6 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

ФЛОСОЛ 30%

Flosolum 30%

Антибактериальный препарат широкого спектра действия



СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 300 мг флорфеникола.

Препарат выпускают в полимерной упаковке по 100, 1000 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Флорфеникол – синтетический антибиотик, производное тиамфеникола. Активен в отношении *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus spp.*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Proteus spp.*, *Enterobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Bordetella spp.* и др., а также *Mycoplasma spp.*

ПОКАЗАНИЯ

Флосол 30% применяют при колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, микоплазмозе сельскохозяйственной птицы; актинобациллярной плевропневмонии, пастереллезе, бордетеллезе, гемофилезе свиней и других заболеваниях, вызванных возбудителями, чувствительными к флорфениколу.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах:

- *свиньям:* 0,15-0,2 мл препарата на 10 кг массы тела животного с водой в сутки, в течение 3-5 дней;
- *птице (цыплята до 4-х недельного возраста):* 330 мл препарата на 1000 л воды или 0,04 мл препарата на 1 кг массы тела птицы (при индивидуальной даче), в течение 3-5 дней;
- *птице (другие возрастные категории):* 700 мл препарата на 1000 л воды или 0,07 мл препарата на 1 кг массы тела птицы (при индивидуальной даче), в течение 3-5 дней.

Свиньям и птице раствор готовят из расчета потребности в воде на одни сутки. Во время лечения свиньи и птица должны получать только воду, содержащую препарат.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата при тяжелых поражениях системы кроветворения, печени и почек, а также при индивидуальной повышенной чувствительности к амфениколам.

Не допускается применение препарата для лечения свиноматок в период беременности и лактации, а также хряков-производителей.

Запрещено применение препарата птице, чье яйцо используется в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не рекомендуется одновременное применение с препарата другими антибиотиками, непрямыми антикоагулянтами, барбитуратами, миорелаксантами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо свиней – 23 суток. Мясо птицы – 6 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

ФОСФОЛЕКС

Phospholexum



Комплексный антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 100 мг левофлоксацина (в форме левофлоксацина гемигидрата), 100 мг фосфомицина (в форме динатриевой соли).

Препарат выпускают в полимерных флаконах по 100, 500, 1000 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Левофлоксацин – антибиотик группы фторхинолонов.

Фосфомицин – антибиотик, производное фосфоновой кислоты.

Препарат активен в отношении *Aeromonas spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Klebsiella spp.*, *Escherichia coli*, *Enterobacter spp.*, *Campylobacter spp.*, *Salmonella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Proteus spp.*, *Chlamydia spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Mycoplasma spp.* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Фосфолекс применяют свиньям и сельскохозяйственной птице при колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, гемофилезе, микоплазмозе, стафилококкозе, пневмонии, остром бактериальном синусите, остром и хроническом бронхите и других инфекционных заболеваниях бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к левофлоксацину и фосфомицину у животных.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат назначают в следующих дозах:

- *птице:* 300-500 мл на 1000 л питьевой воды в течение 3-5 дней. Раствор готовят из расчета потребности птицы в воде на одни сутки. В период лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат;
- *свиньям:* 400-500 мл на 1000 л питьевой воды в течение 3- 5 дней. При индивидуальной даче доза препарата 0,1-0,15 мл на 10 кг массы тела животного.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещено применять препарат животным при нарушениях функции почек, печени, повышенной к чувствительности к фторхинолонам и фосфомицину.

Запрещается применять препарат поросятам с массой тела менее 20 кг супоросным и подсосным свиноматкам; а также птице, чьё яйцо используется в пищу людям, ремонтному молодняку кур позднее 14 дней до начала яйцекладки.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Противопоказано совместное применение препарата с бактериостатическими антибиотиками (тетрациклинами, макролидами и амфениколами), теофиллином, стероидами, непрямыми антикоагулянтами. Прием совместно с железосодержащими лекарственными средствами, сукральфатом и антацидными лекарственными средствами, содержащими магний, кальций и алюминий, приводит к снижению всасывания фторхинолонов, поэтому его следует назначать за 1-2 часа до или через 4 часа после приема вышеуказанных лекарственных средств.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо свиней – 9 дней. Мясо птицы – 9 дней.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

ФОСФОТРИМ ПЛЮС OR

Fosfotrimum Plus OR



Комплексный противомикробный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 100 мг фосфомицина (в форме динатриевой соли) и 25 мг триметоприма.

Препарат выпускают в полимерных флаконах по 100, 500, 1000 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фосфомицин – антибиотик, производное фосфоновой кислоты.

Триметоприм – химиотерапевтический препарат из группы диаминопиримидинов.

Препарат эффективен в отношении большинства грамположительных микроорганизмов, таких как *Enterococcus faecalis*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus spp.* в том числе *Streptococcus faecalis*, и грамотрицательных микрорганизмов, таких как *Escherichia coli*, *Citrobacter spp.* (в том числе *Citrobacter diversus*, *Citrobacter freundii*), *Enterobacter spp.* (в том числе *Enterobacter aerogenes*), *Morganella morganii*, *Proteus mirabilis*, *Proteus vulgaris*, *Serratia spp.* (в том числе *Serratia marcescens*) и др.

Препарат оказывает менее выраженное действие на *Klebsiella spp.,* в том числе *Klebsiella pneumonia*.

ПОКАЗАНИЯ

Фосфотрим Плюс OR применяют сельскохозяйственной птице при инфекциях дыхательной системы (инфекционный острый ринит, ринотрахеит и др.), при инфекциях пищеварительной системы (сальмонеллез, колибактериоз, язвенно-некротический энтерит и др.) и других заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к фосфомицину натрия и триметоприму.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Птице препарат применяют в дозе 1-2 мл на 1 л питьевой воды в течение 3-5 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата. Запрещается применять птице, чье яйцо используется в пищу людям.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо птицы – 8 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

ЦИПРОМЕТ

Cyprometum



Комплексный противомикробный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 100 мг ципрофлоксацина и 50 мг триметоприма.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 20, 50, 100, 200 мл, полимерных флаконах по 20, 100, 500, 1000 мл и полимерных канистрах по 5000 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Ципрофлоксацин – антибиотик группы фторхинолонов. Активен в отношении *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella spp.*, *Escherichia coli*, *Enterobacter spp.*, *Campylobacter spp.*, *Salmonella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Proteus spp.*, *Chlamydia spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Mycoplasma spp.* и *Mycobacterium spp.* и др.

Триметоприм – химиотерапевтический препарат из группы диаминопиримидинов.

Активен в отношении *Escherichia coli, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Salmonella spp., Pasteurella multocida, Haemophilus spp.* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Ципромет применяют свиньям, телятам, птице при колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, гемофилезе, микоплазмозе, стафилококкозе и других инфекционных заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к компонентам препарата.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах:

- *свиньям и телятам:* 0,25-0,5 мл на 10 кг массы тела животного с питьевой водой 2 раза в сутки в течение 3-5 дней;
- *птице:* 500-1000 мл на 1000 л питьевой воды групповым методом или 0,05-0,1 мл на 1 кг массы тела птицы в течение 3-5 дней. Птице раствор препарата готовят из расчета потребности в воде на одни сутки. В период лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат.

При необходимости курс лечения повторяют через 5 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат противопоказан при нарушениях функции почек, печени, повышенной чувствительности к фторхинолонам.

Запрещается применение препарата птице, чьё яйцо используется в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Противопоказано совместное применение препарата с бактериостатическими антибиотиками (тетрациклинами, макролидами и амфениколами), теофиллином, стероидами, непрямыми антикоагулянтами.

Прием совместно с железосодержащими лекарственными средствами, сукральфатом и антацидными лекарственными средствами, содержащими магний, кальций и алюминий, приводит к снижению всасывания ципрофлоксацина, поэтому его следует назначать за 1-2 часа до или через 4 часа после приема вышеуказанных лекарственных средств.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 14 суток. Мясо птицы – 12 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

Не допускается замораживание препарата и транспортировка при температуре ниже плюс 5 °С.

ЦИПРОФЛОКС

Cyprofloxum



Высокоэффективный антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 50 мг ципрофлоксацина гидрохлорида.

Препарат выпускают в полимерных флаконах по 100, 500, 1000 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Ципрофлоксацин – антибиотик группы фторхинолонов. Активен в отношении *Escherichia coli, Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Enterobacter spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Campylobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus spp., Aeromonas spp., Shewanella putrefaciens, Staphylococcus spp.* (включая пенициллиназо-продуцирующие и метициллинустойчивые штаммы), *Mycoplasma spp.* и *Mycobacterium spp.*

ПОКАЗАНИЯ

Ципрофлокс применяют свиньям, молодняку крупного рогатого скота и сельскохозяйственной птице при колибактериозе, сальмонеллезе, пастерелезе, гемофилезном полисерозите и актинобациллярной плевропневмонии свиней, микоплазмозе, стафилококкозе; прудовой рыбе при аэромонозе, псевдомонозе, протеозе и других инфекционных заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к ципрофлоксацину.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах:

- *свиньям и телятам:* 0,5-1,0 мл на 10 кг массы тела животного с питьевой водой 2 раза в сутки в течение 3-5 дней;
- *сельскохозяйственной птице:* 0,1-0,2 мл на 1 кг массы тела птицы (при индивидуальной даче) или 5-10 мл на 10 л питьевой воды групповым методом в течение 3-5 дней. Птице раствор препарата готовят из расчета потребности в воде на одни сутки. В период лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат.
- *прудовой рыбе:* методом лечебных ванн из расчета 20 мл/м^3 воды с экспозицией 10 минут, в течение 5 дней.

При необходимости курс лечения повторяют через 5 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат противопоказан при нарушениях функции почек, печени, повышенной к чувствительности к фторхинолонам.

Запрещается применение препарата птице, чье яйцо используется в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Противопоказано совместное применение препарата с бактериостатическими антибиотиками (тетрациклинами, макролидами и амфениколами), теофилином, стероидами, непрямыми антикоагулянтами.

Прием совместно с железосодержащими лекарственными средствами, сукральфатом и антацидными лекарственными средствами, содержащими магний, кальций и алюминий, приводит к снижению всасывания ципрофлоксацина, поэтому его следует назначать за 1-2 часа до или через 4 часа после приема вышеуказанных лекарственных средств.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 14 дней. Мясо птицы – 12 дней. Реализация товарной рыбы – 12 дней.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

ЭНРОКОЛ

Enrocolum



Комплексный антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 100 мг энрофлоксацина и 1000000 МЕ колистина сульфата.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 100, 400, 450 мл и полимерной упаковке по 20, 100, 500, 1000, 5000 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Энрофлоксацин – антибиотик из группы фторхинолонов.

Активен в отношении *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella spp.*, *Escherichia coli*, *Enterobacter spp.*, *Campylobacter spp.*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Aeromonas spp.*, *Haemophilus spp.*, *Proteus spp.*, *Yersinia spp.*, *Chlamydia spp.*, *Staphylococcus spp.* (включая пенициллиназо-продуцирующие и метициллинустойчивые штаммы), *Mycoplasma spp.* и др.

Колистина сульфат – смесь сульфатных полипептидов, продуцируемых некоторыми штаммами *Bacillus polymyxa*.

Активен в отношении *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Haemophilus spp.* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Энрокол применяют сельскохозяйственной птице при колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, микоплазмозе, инфекционном синовите, инфекционном рините, стафилококкозе и свиньям при колибактериозе, бордетеллиозе, сальмонеллезе, энтеритах, токсикоинфекциях и других заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к компонентам препарата.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Энрокол применяют с питьевой водой в следующих дозах:

- *птице:* 0,1 мл на 1 кг массы тела птицы или 1 л на 2000 л питьевой воды 1 раз в день групповым методом в течение 3-5 дней. Птице раствор препарата готовят из расчета потребности в воде на одни сутки. В период лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат;
- *свиньям:* 0,3 мл на 10 кг массы тела животного 1 раз в сутки в течение 3-5 дней.

При тяжелой форме заболевания дозу увеличивают до 0,5 мл на 10 кг массы тела животного.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат противопоказан при нарушениях функции почек, печени, повышенной чувствительности к фторхинолонам и колистину.

Запрещается применение препарата птице, чье яйцо используется в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Противопоказано совместное применение препарата с бактериостатическими антибиотиками (тетрациклинами, макролидами, амфениколом и флорфениколом), стероидами, непрямыми антикоагулянтами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо птицы – 12 дней. Мясо свиней – 15 дней.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

ЭНРОКСОЛ

Enroxolum



Антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 200 мг энрофлоксацина.

Препарат выпускают в полимерных флаконах 100, 500, 1000, 5000 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Энрофлоксацин – антибиотик из группы фторхинолонов.

Активен в отношении *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella spp.*, *Escherichia coli*, *Enterobacter spp.*, *Campylobacter spp.*, *Salmonella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Proteus spp.*, *Chlamydia spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Mycoplasma spp.* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Энроксол применяют свиньям, телятам и сельскохозяйственной птице при колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, гемофилезе, микоплазмозе, стафилококкозе и других инфекционных заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к энрофлоксацину.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах:

- *свиньям:* 0,1-0,25 мл на 10 кг массы тела животного или 0,5-1 л на 2000 л питьевой воды один раз в день в течение 3-5 дней;
- *телятам:* 0,25-0,5 мл на 10 кг массы тела животного один раз в день в течение 3-5 дней. Перед применением препарат необходимо развести в небольшом количестве воды (в соотношении 1:10);
- *птице:* 2,5 мл на 10 л питьевой воды один раз в день в течение 3-5 дней.

Птице раствор препарата готовят из расчета потребности в воде на одни сутки. В период лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат.

При необходимости курс лечения повторяют через 5 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат противопоказан при нарушениях функции почек, печени, повышенной чувствительности к фторхинолонам.

Запрещается применение препарата птице, чьё яйцо используется в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Противопоказано совместное применение препарата с бактериостатическими антибиотиками (тетрациклинами, макролидами и левомицетином), теофилином, стероидами, непрямыми антикоагулянтами.

Прием совместно с железосодержащими лекарственными средствами, сукральфатом и антацидными лекарственными средствами, содержащими магний, кальций и алюминий, приводит к снижению всасывания энрофлоксацина, поэтому его следует назначать за 1-2 часа до или через 4 часа после приема вышеуказанных лекарственных средств.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 14 суток. Мясо птицы – 12 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

АЙВАЗОЛ

Aivazolum

Антибактериальный препарат широкого спектра действия



СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 625 мг ацетилизовалерилтилозина тартрата (тилвалозина тартрата).

Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 250, 500, 1000 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Ацетилизовалерилтилозин – макролидный антибиотик из группы тилозина. Активен в отношении грамположительных микроорганизмов: *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus spp.*, *Clostridium pefringens*, грамотрицательных микроорганизмов: *Lawsonia intracellularis*, *Ornithobacterium rhinotracheale*, *Brachyspira hyodysenteriae*, *Brachyspira pilosicoli*, *Pasteurella spp.*, *Chlamydia spp.* и микоплазм: *Mycoplasma gallicepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Mycoplasma meleagrids*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Mycoplasma hyosynoviae* и *Mycoplasma hyorhinis* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Айвазол применяют птице (цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур, индейкам) при хронических респираторных заболеваниях, орнитобактериозе, инфекционном синусите, сальпингите, клостридиозе, некротическом энтерите, диареи, холангиогепатите; свиньям при энзоотической пневмонии, илеите (пролиферативной энтеропатии у поросят), дизентерии свиней, колите у поросят, атрофическом рините, микоплазменном артрите, некротическом энтероколите и других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к ацетилизовалерилтилозину.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах:

- *свиньям:* 4-8 мг препарата на 1 кг массы тела животного в сутки в течение 5-7 дней или 80-160 г препарата на 1000 кг корма или 1000 л питьевой воды в течение 5-7 дней;
- *птице (цыплятам-бройлерам и ремонтному молодняку кур):* 24-40 мг препарата на 1 кг массы тела птицы в сутки в течение 3-5 дней или 40-80 г препарата на 400 л питьевой воды в течение 3-5 дней;
- *индейкам:* 40 мг препарата на 1 кг массы тела птицы в сутки в течение 5 дней или 40-80 г препарата на 400 л питьевой воды в течение 5 дней.

Птице при индивидуальной даче препарат применяют в дозе 24 – 40 мг препарата на 1 кг массы тела птицы в сутки, предварительно смешав с кормом или водой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не рекомендуется животным, имеющим индивидуальную чувствительность к макролидам.

Запрещается применение препарата птице, чьё яйцо используется в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не рекомендуется одновременное применение с антибиотиками из групп пенициллинов и цефалоспоринов, линкозамидами (клиндамицин, линкомицин), амфениколами, рифампицином.

Айвазол можно комбинировать с антибиотиками группы тетрациклина.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо свиней и птицы – 3 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от 0 °С до +25 °С, в защищенном от света и влаги месте.

АМОКСИКАР 50%

Amoxycarum 50%



Противомикробный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 500 мг амоксициллина тригидрата.

Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 200, 500, 1000 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Амоксициллин – полусинтетический антибиотик из группы пенициллинов. Активен в отношении *Staphylococcus spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Corynebacterium spp.*, *Clostridium spp.*, *Campylobacter spp.*, *Salmonella spp.*, *Escherichia coli*, *Haemophilus spp.*, *Bacteroides spp.*, *Fusobacterium necrophorum*, *Proteus spp.* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Амоксикар 50% применяют молодняку крупного рогатого скота, свиньям и сельскохозяйственной птице при колибактериозе, сальмонеллезе, клостридиозе и других инфекционных заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к амоксициллину.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах:

- *телятам, свиньям:* 40-80 мг на 1 кг массы тела животного (или 15-25 г на 100 л питьевой воды) в смеси с кормом, водой или молоком 2 раза в сутки, в течение 5-7 дней; свиньям старше 6 месяцев – с кормом или водой. В тяжелых случаях доза препарата может быть увеличена в 2 раза.

Раствор препарата готовят непосредственно перед применением. Препарат не подлежит хранению в растворенном виде;

- *птице:* в первой декаде жизни 80 г на 400 л питьевой воды (200 г/1000 л) или 20 мг на 1 кг массы тела птицы по ДВ в течение 3-5 дней; в последующие периоды 240-320 г на 1000 л питьевой воды или 40-60 мг на 1 кг массы тела птицы по ДВ в течение 3-5 дней.

Птице раствор готовят из расчета потребности в воде на одни сутки. Во время лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата птице, чьё яйцо используется в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Запрещается совместное применение препарата с антибиотиками групп тетрациклина, амфеникола, макролидами и линкозамидами, сульфаниламидами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 15 суток. Мясо птицы – 5 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от 0 °С до +25 °С, в защищенном от света и влаги месте.

АМОКСИКАР 80%

Amoxycarum 80%

Антибактериальный препарат широкого спектра действия



СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 800 мг амоксициллина тригидрата.

Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 200, 500, 1000 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Амоксициллин – полусинтетический антибиотик из группы пенициллинов. Активен в отношении *Staphylococcus spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Corynebacterium spp.*, *Clostridium spp.*, *Campylobacter spp.*, *Salmonella spp.*, *Escherichia coli*, *Haemophilus spp.*, *Bacteroides spp.*, *Fusobacterium necrophorum*, *Proteus spp.* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Амоксикар 80% применяют молодняку крупного рогатого скота, свиньям и сельскохозяйственной птице при колибактериозе, сальмонеллезе, клостридиозе и других инфекционных заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к амоксициллину.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах:

- *телятам, свиньям:* 25-40 мг на 1 кг массы тела животного (или 10-15 г на 100 л питьевой воды) в смеси с кормом, водой или молоком 2 раза в сутки, в течение 5-7 дней; свиньям старше 6 месяцев – с кормом или водой. В тяжелых случаях доза препарата может быть увеличена в 2 раза.

Раствор препарата готовят непосредственно перед применением. Препарат не подлежит хранению в растворенном виде;

- *птице:* в первой декаде жизни 50 г на 400 л питьевой воды (125 г/1000 л) или 20 мг на 1 кг массы тела птицы по ДВ в течение 3-5 дней; в последующие периоды 150-200 г на 1000 л питьевой воды или 40-60 мг на 1 кг массы тела птицы по ДВ в течение 3-5 дней.

Птице раствор готовят из расчета потребности в воде на одни сутки. Во время лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата птице, чьё яйцо используется в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Запрещается совместное применение с антибиотиками групп тетрациклина, амфеникола, макролидами и линкозамидами, сульфаниламидами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 15 суток. Мясо птицы – 5 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от 0 °С до +25 °С, в защищенном от света и влаги месте.

АМОКСИКОЛ АЛ

Amoxycolum AL



Комплексный антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 3200000 МЕ колистина сульфата и 450 мг амоксициллина тригидрата.

Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 200, 500, 1000 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Колистина сульфат – смесь сульфатных полипептидов, продуцируемых некоторыми штаммами *Bacillus polymyxa*.

Активен в отношении *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Haemophilus spp.* и др.

Амоксициллин – полусинтетический антибиотик группы пенициллинов. Активен в отношении *Staphylococcus spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Corynebacterium spp.*, *Clostridium spp.*, *Campylobacter spp.*, *Brucella spp.*, *Salmonella spp.*, *Escherichia coli*, *Haemophilus spp.*, *Fusobacterium necrophorum*, *Proteus spp.* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Амоксикол АЛ применяют свиньям, сельскохозяйственной птице, молодняку крупного рогатого скота, овцам и козам при колибактериозе, сальмонеллезе, стафилококкозе, стрептококкозе, псевдомонозе и других заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к амоксициллину и колистину сульфату.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Амоксикол АЛ применяют индивидуально или групповым способом в следующих дозах:

- *телятам до 6-месячного возраста, овцам, козам:* 0,2 г на 10 кг массы тела животного 2 раза в день в течение 3-5 дней с кормом или питьевой водой;
- *свиньям:* 0,35-0,4 кг на 1000 л питьевой воды в течение 3-5 дней или 0,2 г на 10 кг массы тела животного 2 раза в день с кормом или питьевой водой в течение 3-5 дней;
- *сельскохозяйственной птице:* 0,35-0,4 кг на 1000 л питьевой воды или 0,07 г на 1 кг массы тела птицы (при индивидуальной даче) в течение 3-5 дней.

Птице раствор препарата готовят из расчета потребности птицы в воде на одни сутки. В период лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять препарат птице, чье яйцо используется в пищу людям, и ремонтному молодняку кур позднее 14 дней до начала яйцекладки.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Запрещается совместное применение препарата с антибиотиками групп тетрациклина, амфеникола, макролидами и линкозамидами, сульфаниламидами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных и птицы – 8 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от 0 °С до +25 °С, в защищенном от света и влаги месте.

ВИРДЖИН 110

Virdjinum 110

Антибактериальный препарат широкого спектра действия



СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 110 мг вирджиниамицина.

Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 200, 500, 1000 г, многослойных крафт-мешках с полиэтиленовым покрытием по 50, 100, 200, 500, 1000 г и 5, 10, 20, 25 кг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вирджиниамицин – антибиотик из группы стрептограминов.

Вирджиниамицин состоит из двух компонентов – фактора М (72%) и фактора S (28%). Каждый фактор по отдельности обладает бактериостатическим действием, а в комплексе – бактерицидным в отношении большинства грамположительных и некоторых грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Clostridium perfringens, Micrococcus spp., Campylobacter spp., Listeria monocytogenes* и др., в меньшей степени эффективен в отношении *Klebsiella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Escherichia coli, Salmonella spp.*

ПОКАЗАНИЯ

Вирджин 110 применяют свиньям для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта бактериальной этиологии (клостридиоз, сальмонеллез, колибактериоз и др.), сельскохозяйственной птице для лечения некротического энтерита.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вирджин 110 применяют в смеси с кормом в следующих дозах:

- *курам-несушкам:* 140-180 г на 1000 кг корма, ежедневно в течение 8-14 дней;
- *бройлерам:* 180-200 г на 1000 кг корма, ежедневно в течение 8-14 дней.

Допускается применение – в дозе 0,5-1,5 мг вирджиниамицина на 1 кг массы тела птицы в день, в течение 8-14 дней;

- *свиньям:* 1000 г на 1000 кг корма, ежедневно в течение 14 дней, затем 500 г на 1000 кг корма, ежедневно в течение 28 дней.

При необходимости курс лечения свиней и птицы можно повторить.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять препарат животным с индивидуальной повышенной чувствительностью к его компонентам.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Возможно применение препарата одновременно с другими антибактериальными средствами, а также совместно с кокцидиостатиками и нестероидными противовоспалительными средствами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо свиней – 28 дней. Мясо птицы – 28 дней. Яйцо –7 дней.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от – 25°С до + 25°С, в защищенном от света и влаги месте.

ВИРДЖИН 500

Virdjinum 500

Антибактериальный препарат широкого спектра действия



СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 500 мг вирджиниамицина.

Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 200, 500, 1000 г, многослойных крафт-мешках с полиэтиленовым покрытием по 50, 100, 200, 500, 1000 г и 5, 10, 20, 25 кг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вирджиниамицин – антибиотик из группы стрептограминов.

Вирджиниамицин состоит из двух компонентов – фактора М (72%) и фактора S (28%). Каждый фактор по отдельности обладает бактериостатическим действием, а в комплексе – бактерицидным в отношении большинства грамположительных и некоторых грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Clostridium perfringens, Micrococcus spp., Campylobacter spp., Listeria monocytogenes* и др., в меньшей степени эффективен в отношении *Klebsiella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Escherichia coli, Salmonella spp.*

ПОКАЗАНИЯ

Вирджин 500 применяют свиньям для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта бактериальной этиологии (клостридиоз, сальмонеллез, колибактериоз и др.), сельскохозяйственной птице для лечения некротического энтерита.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вирджин 500 применяют в смеси с кормом в следующих дозах:

- *курам-несушкам:* 30-40 г на 1000 кг корма, ежедневно в течение 8-14 дней;
- *бройлерам:* 40-50 г на 1000 кг корма, ежедневно в течение 8-14 дней.

Допускается применение в дозе 0,5-1,5 мг вирджиниамицина на 1 кг массы тела птицы в день, в течение 8-14 дней.

- *свиньям:* 220 г на 1000 кг корма, ежедневно в течение 14 дней, затем 110 г на 1000 кг корма, ежедневно в течение 28 дней.

При необходимости курс лечения свиней и птицы можно повторить.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять препарат животным с индивидуальной повышенной чувствительностью к его компонентам.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Возможно применение препарата одновременно с другими антибактериальными средствами, а также совместно с кокцидиостатиками и нестероидными противовоспалительными средствами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо свиней – 28 дней. Мясо птицы – 28 дней. Яйцо – 7 дней.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от – 25°С до + 25°С, в защищенном от света и влаги месте.

ГЕНТАН WS 20%

Gentanum WS 20%



Антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 200 мг гентамицина (в форме гентамицина сульфата).

Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 200, 500, 1000 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Гентамицина сульфат – антибиотик из группы аминогликозидов.

Активен в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, в том числе *Escherichia coli*, *Enterobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Salmonella spp.*, *Proteus spp.*, *Campylobacter spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Pasteurella spp.*, *Staphylococcus aureus*, *Mycoplasma spp.* и др.; не действует на анаэробные бактерии, вирусы, простейших и грибы, оказывает слабое действие на отдельные штаммы *Streptococcus spp.*

ПОКАЗАНИЯ

Гентан WS 20% применяют телятам, поросятам и сельскохозяйственной птице при респираторных, желудочно-кишечных и других заболеваниях бактериальной этиологии, вызываемых микроорганизмами, чувствительными к гентамицину сульфату.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в суточных дозах (с питьевой водой):

- *телятам:* в первый день 2,5 г на 100 кг массы тела животного, разделенные на два приема с интервалом 12 ч; в последующие 2-4 дня – 2 г на 100 кг массы тела животного;
- *поросятам:*

при колибактериозе – 5,5 г на 100 л питьевой воды в течение 3 дней;

при сальмонеллезе – 7,5 г на 100 л питьевой воды в течение 4 дней;

при кампилобактериозе и дизентерии –11 г на 100 л питьевой воды в течение 5 дней;

- *молодняку сельскохозяйственной птицы (цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку, индюшатам с первых дней жизни):* 2,5 г на 100 л питьевой воды в течение 5-7 дней.

В течение всего периода лечения молодняк свиней и сельскохозяйственной птицы должен получать только воду, содержащую препарат.

Для всех видов животных и птицы, лечебный раствор лекарственного препарата готовят ежедневно, порошок должен быть полностью растворен в воде.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять препарат продуктивным животным, чьё молоко используется в пищу людям; птице, чье яйцо используется в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не рекомендуется совместное применение препарата с антибиотиками, содержащими в своем составе стрептомицин, канамицин и неомицин, а также с диуретиками и миорелаксантами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 21 день. Мясо птицы – 25 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от 0 °С до +25 °С, в защищенном от света и влаги месте.

ДОКСИКАР

Doxycarum

Антибактериальный препарат широкого спектра действия



СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 500 мг доксициклина гиклата.

Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 500, 1000 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Доксициклин – полусинтетический антибиотик группы тетрациклинов, производное окситетрациклина. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Listeria monocytogenes*, *Corynebacterium spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathie*, *Clostridium spp.*, *Salmonella spp.*, *Escherichia coli*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Campylobacter spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Bordetella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Actinobacillus spp.*, а также *Chlamydia spp.*, *Rickettsia spp.*, *Mycoplasma spp.*, *Borrelia spp.* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Доксикар применяют сельскохозяйственной птице при колибактериозе, пастереллезе, сальмонеллезе, микоплазмозе, стафилококкозе; свиньям при энзоотической пневмонии, плевропневмонии, бордетеллезе, сальмонеллезе, колибактериозе, дизентерии, лептоспирозе и других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к доксициклину.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах:

- *свиньям:* 20-40 мг на 1 кг массы тела животного или 200 г препарата на 1000 л питьевой воды (или 1 т корма) в течение 3-5 дней;
- *сельскохозяйственной птице (цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур-несушек, гусятам):* 20-40 мг на 1 кг массы тела птицы или 200-400 г препарата на 1000 л питьевой воды (или 1 т корма) в течение 3-5 дней. В период лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата птице, чье яйцо используется в пищу людям.

Запрещается использовать препарат с молоком и молочными продуктами.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками групп пенициллина, полимиксина и препаратами, содержащими соединения кальция, алюминия и магния.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных и птицы – 20 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от 0 °С до +25 °С, в защищенном от света и влаги месте.

КЛАВУМОКС 62,5%

Clavumoxum 62,5%



Комплексный антимикробный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 500 мг амоксициллина тригидрата и 125 мг клавулановой кислоты (в форме клавуланата калия).

Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 200, 500, 1000 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Амоксициллин – полусинтетический антибиотик группы пенициллинов.

Активен в отношении *Staphylococcus spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Corynebacterium spp.*, *Clostridium spp.*, *Campylobacter spp.*, *Salmonella spp.*, *Bordetella spp.*, *Escherichia coli*, *Haemophilus spp.*, *Bacteroides spp.*, *Proteus spp.* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Клавумокс 62,5% применяют свиньям и сельскохозяйственной птице при колибактериозе, сальмонеллезе, бронхопневмонии, мочеполовых инфекциях, инфекциях кожи и мягких тканей и других заболеваниях, вызванных микроорганизмами чувствительными к амоксициллину.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах:

- *свиньям:* 0,8-2,0 г на 100 кг массы тела животного 2 раза в сутки в течение 3-5 дней с кормом, водой или молоком;
- *цыплятам-бройлерам до 10 дневного возраста:* 20 г препарата на 400 л питьевой воды в течение 3-5 дней;
- *цыплятам-бройлерам старше 10 дней:* 20 г препарата на 200 л питьевой воды в течение 3-5 дней.

Раствор готовят из расчета потребности птицы в воде на одни сутки. В период лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять птице, чье яйцо используются в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Запрещается совместное применение препарата с антибиотиками групп тетрациклина, амфеникола, макролидами, линкозамидами, сульфаниламидами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо свиней и птицы – 15 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от 0 °С до +25 °С, в защищенном от света и влаги месте.

КЛОКСАМОКС

Cloxamoxum



Комплексный противомикробный препарат с широким спектром действия

СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 250 мг амоксициллина тригидрата и 250 мг клоксациллина натрия.

Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 500, 1000, 5000 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Амоксициллин – полусинтетический антибиотик группы пенициллинов.

Активен в отношении *Staphylococcus spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Corynebacterium spp.*, *Clostridium spp.*, *Campylobacter spp.*, *Salmonella spp.*, *Bordetella spp.*, *Escherichia coli*, *Haemophilus spp.*, *Bacteroides spp.*, *Proteus spp.* и др.

Клоксациллин – антибиотик из группы пенициллинов.

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Corynebacterium pyogenes*, *Escherichia coli* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Клоксамокс применяют молодняку крупного рогатого скота, свиней и птицы при колибактериозе, сальмонеллезе, клостридиозе и других инфекционных болезнях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к амоксициллину и клоксациллину.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах:

- *телятам и поросятам:* 40-80 мг на 1 кг массы тела животного в смеси с кормом, водой или молоком, 2 раза в сутки в течение 5-7 дней (или 15-25 г на 100 л питьевой воды);
- *птице до 10-дневного возраста:* 35 г на 400 л воды в течение 3-5 дней;
- *птице в последующие периоды:* 35 г на 200 л воды в течение 3-5 дней.

Птице раствор готовят из расчета потребности в воде на одни сутки. Во время лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата птице, чье яйцо используется в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Запрещается совместное применение препарата с антибиотиками групп тетрациклина, амфеникола, макролидами, линкозамидами, сульфаниламидами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 15 суток. Мясо птицы – 5 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от 0 °С до +25 °С, в защищенном от света и влаги месте.

ЛЕВОЛОКС ПОРОШОК

Pulvis Levoloxum

Антибактериальный препарат широкого спектра действия



СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 100 мг левофлоксацина (в форме левофлоксацина гемигидрата).

Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 500, 1000 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Левофлоксацин – антибиотик группы фторхинолонов

Препарат активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: *Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp., Escherichia coli, Enterobacter spp., Campylobacter spp., Salmonella spp., Haemophilus spp., Proteus spp., Chlamydia spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Mycoplasma spp., Mycobacterium spp.* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Леволокс порошок применяют при колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, гемофилезе, микоплазмозе, стафилококкозе, пневмонии, остром бактериальном синусите, остром и хроническом бронхите и других инфекционных заболеваниях бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к левофлоксацину у свиней и птиц, а также аэромонозе, псевдомонозе и других инфекционных заболеваниях бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к левофлоксацину у рыб.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат назначают в следующих дозах:

- *птице:* 0,5-0,8 кг препарата на 1000 л питьевой воды в течение 5-7 дней. При индивидуальной даче доза препарата 1,0-1,5 г препарата на 15-20 кг массы тела птицы.

Раствор готовят из расчета потребности птицы в воде на одни сутки. В период лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат;

- *свиньям:* 0,5-0,75 г препарата на 10 кг массы тела животного или 0,5-0,75 кг препарата на 1000 л питьевой воды в течение 5-7 дней;
- *рыбам:* 1,5 кг на 1 т корма, применяют методом группового скармливания в составе лечебного корма или методом лечебных ванн. Полученный корм скармливают карповым рыбам из расчета 5%, осетровым и лососевым рыбам – 3 % от общей массы прокармливаемой рыбы в течение 5 дней подряд. При использовании метода лечебных ванн препарат применяют с экспозицией 10 минут из расчета 20 г препарата на 1 $м^3$ воды 1 раз в день в течение 5 дней подряд.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять препарат курам-несушкам и ремонтному молодняку кур позднее 14 дней до начала яйцекладки, супоросным и подсосным свиноматкам.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Противопоказано совместное применение препарата с бактериостатическими антибиотиками (тетрациклинами, макролидами и амфениколами), теофиллином, стероидами, непрямыми антикоагулянтами. Прием совместно с железосодержащими лекарственными средствами, сукральфатом и антацидными лекарственными средствами, содержащими магний, кальций и алюминий, приводит к снижению всасывания фторхинолонов, поэтому его следует назначать за 1-2 часа до или через 4 часа после приема вышеуказанных лекарственных средств.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо свиней – 9 дней. Мясо птицы – 7 дней. Реализация товарной рыбы – 7 дней.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от 0 °С до +25 °С, в защищенном от света и влаги месте.

ЛИНСПЕКТ 44

Linspectum 44

Комплексный антибактериальный препарат широкого спектра действия



СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 22 мг линкомицина гидрохлорида и 22 мг спектиномицина сульфата.

Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 200, 500, 1000, 10000 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Линкомицин – антибиотик группы линкозамидов.

Спектиномицин – антибиотик группы аминогликозидов.

Препарат активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium spp., Escherichia coli, Salmonella spp., Pasteurella multocida, Haemophilus spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Enterobacter spp., Brachyspira hyodysenteriae* и др., а также *Mycoplasma spp.*

ПОКАЗАНИЯ

Линспект 44 применяют свиньям при колибактериозе, сальмонеллезе, дизентерии; сельскохозяйственной птице при колибактериозе, микоплазмозе, сальмонеллезе и других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к линкомицину и спектиномицину.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют с кормом или водой в следующих дозах:

- *свиньям:* 1 г препарата на 10 кг массы тела животного (при индивидуальной даче) или 1 кг препарата на 1 т корма или 1000 л питьевой воды (при групповой даче) в течение 4-7 дней;
- *сельскохозяйственной птице (цыплята-бройлеры, индейки, гуси):* 1,1 г препарата на 1 кг массы тела птицы с кормом/питьевой водой или 1 кг препарата на 1 т корма в течение 3-7 дней. При необходимости доза препарата может быть увеличена до 2 кг на 1 т корма при курсе лечения до 7 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата жвачным животным, лошадям, кроликам, при тяжелых нарушениях функции почек и печени, с осторожностью в период беременности.

Препарат запрещен для применения птице, чьё яйцо используют в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не рекомендуется совместное применение препарата макролидами, пенициллинами, амфениколами, каолином.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо свиней – 14 суток. Мясо птицы – 6 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от 0 °С до +25 °С, в защищенном от света и влаги месте.

ЛИНСПЕКТ 100

Linspectum 100



Комплексный антимикробный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 222 мг линкомицина гидрохлорида, 444 мг спектиномицина сульфата.

Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 200, 500, 1000 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Линкомицин – антибиотик группы линкозамидов.

Спектиномицин – антибиотик группы аминогликозидов.

Препарат активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium spp., Escherichia coli, Salmonella spp., Pasteurella multocida, Haemophilus spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Enterobacter spp., Brachyspira hyodysenteriae* и др., а также *Mycoplasma spp.*

ПОКАЗАНИЯ

Линспект 100 применяют свиньям при колибактериозе, сальмонеллезе, дизентерии; птице при колибактериозе, микоплазмозе, сальмонеллезе и других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к линкомицину и спектиномицину.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют с кормом или водой в следующих дозах:

- *свиньям:* 89-99 г препарата на 1000 л питьевой воды (при групповой даче) или 0,049-0,099 г препарата на 10 кг массы тела животного (при индивидуальной даче) в течение 4-7 дней;
- *сельскохозяйственной птице:* 0,5-1,0 кг препарата на 1000 л питьевой воды или 1000 кг корма в течение 3-7 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата жвачным животным, лошадям, кроликам, при тяжелых нарушениях функции почек и печени, с осторожностью в период беременности.

Препарат запрещен для применения птице, чьё яйцо используют в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не рекомендуется совместное применение препарата с макролидами, пенициллинами, амфениколами, каолином.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо свиней – 14 суток. Мясо птицы – 6 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от 0 °С до +25 °С, в защищенном от света и влаги месте.

НОРФЛОТИНАТ

Norflotinatum

Антибактериальный препарат широкого спектра действия



СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 200 мг норфлоксацина никотината.

Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 200, 500, 1000 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Норфлоксацина – антибиотик группы фторхинолонов. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Escherichia coli, Salmonella spp., Pasteurella multocida, Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., Staphylococcus spp., Mycoplasma spp.* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Норфлотинат применяют птице при колибактериозе, сальмонеллезе, некротическом энтерите, стрептококкозе, гемофилезе и микоплазмозе; свиньям при сальмонеллезе, пастереллезе, бактериальной и энзоотической пневмонии, колисептицемии, атрофическом рините и других болезнях, телятам и ягнятам при респираторных и желудочно-кишечных болезнях, возбудители которых чувствительны к норфлоксацину никотинату.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют с кормом или водой в следующих дозах:

- *свиньям:* 2,0-3,0 г препарата на 100 кг массы тела животного 2 раза в сутки или 1,0 кг препарата на 1000 л питьевой воды или 1 т корма в течение 4-7 дней;
- *телятам и ягнятам:* 15-20 мг препарата на 1 кг массы тела животного 2 раза в сутки в течение 4-7 дней;
- *птице:* 0,8-1,0 кг препарата на 1000 л питьевой воды в течение 4-7 дней.

Раствор препарата готовят из расчета потребности птицы в воде на одни сутки. В период лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат.

При необходимости курс лечения можно повторить через 5 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат противопоказан при нарушениях функции почек, повышенной чувствительности к хинолонам.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками группы макролидов, нестероидными противовоспалительными средствами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 14 суток. Мясо птицы – 12 суток. Яйцо – 7 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от 0 °С до +25 °С, в защищенном от света и влаги месте.

СТРЕПТОМИЦИДИН

Streptomycidinum

Антибактериальный препарат широкого спектра действия



СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 800 мг стрептомицина (в форме стрептомицина сульфата).

Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 200, 500, 1000 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Стрептомицина сульфат – антибиотик из группы аминогликозидов.

Стрептомицина сульфат активен в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, в том числе *Pasteurella multocida, Listeria monocytogenes, Leptospira spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Salmonella spp.*, а также других микроорганизмов чувствительных к стрептомицину сульфату. К стрептомицину устойчивы анаэробные бактерии, грибы, вирусы и простейшие.

ПОКАЗАНИЯ

Стрептомицидин применяют молодняку крупного рогатого скота и свиней при желудочно-кишечных заболеваниях с первых дней жизни, вызываемых микроорганизмами, чувствительными к стрептомицину.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют с водой или молоком 2-3 раза в день с интервалом 8-12 часов в следующих дозах:

- *телятам:* 10-20 мг на 1 кг массы тела животного в течение первых 3-4 дней жизни;
- *поросятам:* 10-20 мг на 1 кг массы тела животного в течение первых 3-4 дней жизни.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять препарат животным с индивидуальной повышенной чувствительностью к стрептомицину.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не допускается совместное применение стрептомицина сульфата с другими аминогликозидными препаратами (неомицин, канамицин, мономицин, гентамицин) вследствие возможного усиления нефротоксического действия.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 7 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от 0 °С до +25 °С, в защищенном от света и влаги месте.

СУПЕРФОС PR

Superfosum PR



Комплексный антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 200 мг фосфомицина кальция, 50 мг тилозина тартрата.

Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 200, 500, 1000 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фосфомицин – антибиотик, производное фосфоновой кислоты.

Тилозин – антибиотик группы макролидов.

Препарат активен в отношении многих микроорганизмов, в том числе: *Enterococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Listeria monocytogenes*, *Bordetella bronchiseptica*, *Pasteurella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Chlamydia spp*, *Corynebacterium spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Enterobacter spp.*, *Proteus spp.*, *Leptospira spp.*, *Citrobacter spp.*, *Fusobacterum necrophorum*, *Morganella morganii*, а также *Mycoplasma spp.* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Суперфос PR назначают свиньям и сельскохозяйственной птице при заболеваниях респираторной системы (инфекционный ринит, пневмония, бронхопневмония, атрофический ринит, пастереллез, актинобациллярная плевропневмония, ринотрахеит, микоплазмоз и др.), инфекциях пищеварительной системы (колибактериоз, сальмонеллез, стрептококковая инфекция, язвенный/некротический энтерит и др.), роже свиней, синдроме мастит-метрит-агалактия (ММА), гемофиллезном полисерозите, цистите, пиелонефрите, бактериальном артрите, заболеваниях кожного покрова (стафилококкоз, стрептококкоз и др.) и других заболеваниях, вызываемых микроорганизмами, чувствительными к фосфомицину кальция и тилозину тартрату.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах:

- *сельскохозяйственной птице (бройлерам, несушкам, ремонтному и родительскому стаду):* 80-160 мг препарата (в зависимости от тяжести протекания заболевания) на 1 кг живой массы с питьевой водой или кормом, в течение 3-7 дней.
- *свиньям (если живая масса менее 5 кг):* 60-160 мг препарата на 1 кг живой массы с питьевой водой или кормом в течение 5-7 дней;
- *свиньям (если живая масса более 5 кг):* 30-120 мг препарата на 1 кг живой массы с питьевой водой или кормом в течение 5-7 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять птице, чьё яйцо используется в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Препарат совместим со всеми ингредиентами кормов, кормовых добавок, а также с тетрациклинами, сульфаниламидами, эритромицином, спектиномицином.

Не применять одновременно с препаратами группы пенициллинов, цефалоспоринами и линкомицином в связи с выраженным снижением антибактериального эффекта тилозина тартрата.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо свиней и птицы – 7 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от 0 °С до +25 °С, в защищенном от света и влаги месте.

СУЛЬФАПРИМ ПОРОШОК

Pulvis Sulfaprimum



Комплексный антимикробный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 200 мг сульфадиазина натрия и 40 мг триметоприма.

Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 200, 500, 1000 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Сульфадиазин натрия – сульфаниламидный препарат.

Триметоприм – химиотерапевтический препарат из группы диаминопиримидинов.

Сульфадиазин и триметоприм обладают синергидным действием.

Препарат активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, таких как *Escherichia coli, Clostridium spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Salmonella spp., Pasteurella multocida, Actinomyces spp., Eimeria spp., Haemophilus spp., Toxoplasma* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Сульфаприм порошок применяют молодняку крупного рогатого скота, ягнятам, свиньям при колибактериозе, пастереллезе, сальмонеллезе, микоплазмозе, стафилококкозе, эймериозе, смешанных бактериальных инфекциях, а также при других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к компонентам препарата.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат назначают в следующих дозах:

- *молодняку крупного рогатого скота до 6-месячного возраста, ягнятам и свиньям в период кормления молоком:* 1 г на 10 кг массы тела животного один раз в сутки с кормом в течение 3-7 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается использовать препарат козам.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не рекомендуется применять препарат в сочетании с препаратами серы и производными парааминобензойной кислоты.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 10 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от 0 °С до +25 °С, в защищенном от света и влаги месте.

ТЕТРАСЕПТ

Tetraseptum



Комплексный антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 50 мг триметоприма, 100 мг тилозина тартрата, 350 мг окситетрациклина, 350 мг сульфаметоксазола.

Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 500 и 1000 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Триметоприм – химиотерапевтический препарат из группы диаминопиримидинов.

Активен в отношении грамотрицательных микроорганизмов: *Escherichia coli, Proteus spp., Salmonella spp., Bordetella spp.* и др. и некоторых грамположительных микроорганизмов: *Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp.* и др.

Сульфаметоксазол – сульфаниламидный препарат. Активен в отношении грамотрицательных микроорганизмов: *Escherichia coli, Salmonella spp., Pasteurella multocida, Brucella spp., Proteus spp.* и др., грамположительных микроорганизмов: *Staphylococcus spp., Streptococcus spp.* и др., а также в отношении кокцидий, токсоплазм и актиномицетов.

Сульфаметоксазол и триметоприм оказывают синергидное бактерицидное действие.

Тилозин – антибиотик из группы макролидов. Активен в отношении грамположительных микроорганизмов: *Corynebacterium spp., Clostridium spp.* и др. и некоторых грамотрицательных микроорганизмов: *Pasteurella multocida, Haemophilus spp., Leptospira spp., Escherichia coli* и др., рикетсий *(Rickettsia spp.),* спирохет *(Spirochaetales),* микоплазм *(Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Mycoplasma meleagridis).*

Окситетрациклин – антибиотик из группы тетрациклинов. Активен в отношении грамположительных микроорганизмов: *Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Listeria monocytogenes, Bacillus anthracis, Clostridium spp.* и др. и грамотрицательных микроорганизмов: *Escherichia coli, Salmonella spp., Pasteurella multocida, Leptospira spp.* и др. Антибиотик не активен в отношении протея, синегнойной палочки, большинства грибов и вирусов.

ПОКАЗАНИЯ

Тетрасепт применяют для лечения свиней при актинобациллярной плевропневмонии, дизентерии, роже, сальмонеллезе, пастереллезе, артритах инфекционного происхождения и других инфекционных болезнях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к действующим веществам препарата.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют свиньям (индивидуально или групповым способом) в смеси с кормом:

- 0,2-0,4 г препарата на 10 кг массы тела животного в течение 7-10 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещено использовать животным, имеющим индивидуальную чувствительность к действующим веществам препарата.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Запрещается совместное применение препарата с препаратами из групп пенициллина и цефалоспорина и линкомицином, а также с парааминобензойной кислотой и ее соединениями.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо свиней – 20 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от 0 °С до + 25 °С, в защищенном от света и влаги месте.

ТИАМУТИН WS

Tyamutinum WS

Антибактериальный препарат широкого спектра действия



СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 500 мг тиамулина (в форме тиамулин гидроген фумарата).

Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 200, 500, 1000 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тиамулин – является полусинтетическим дериватам дитерпенового антибиотика плевромутилина.

Активен в отношении грамположительных микроорганизмов: *Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria spp.,* грамотрицательных микро-организмов: *Pasteurella spp., Actinobacillus (Haemophilus) spp., Fusobacterium necrophorum, Bacteroides spp., Campylobacter coli, Lawsonia intracellularis,* а также *Mycoplasma spp., Serpulina hyodysenteriae, Serpulina innocens, Serpulina pilosicoli, Serpulina suis, Leptospira spp., Treponema hyodysenteriae, Chlamydia spp., Rickettsia spp.*

К препарату не чувствительны бактерии семейства *Enterobacteriaceae*, в т. ч. *Salmonella spp.* и *Escherichia coli,* синегнойная палочка, грибы и вирусы.

ПОКАЗАНИЯ

Тиамутин WS применяют при дизентерии, энзоотической пневмонии, актинобациллезной плевропневмонии свиней, респираторных патологиях, микоплазмозе птицы и других заболеваниях, вызываемых микроорганизмами, чувствительными к тиамулину.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах (индивидуально или групповым способом в смеси с кормом или питьевой водой, 1 раз в сутки):

• *свиньям:*

– при патологии желудочно-кишечного тракта: 1-2 г препарата на 100 кг массы тела животного в течение 3-5 дней;

– при патологии респираторной системы: 2-4 г препарата на 100 кг массы тела животного в течение 5-10 дней;

• *птице (цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур до 16-недельного возраста, родительскому поголовью):* 0,5-1 г препарата на 10 кг массы тела птицы в течение 3-5 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять препарат свиноматкам в течение первого месяца супоросности, племенным хрякам.

Запрещается применять препарат птице, чьё яйцо используется в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Противопоказано совместное применение препарата с кокцидиостатиками (монензин, салиномицин и наразин), а также менее чем за 7 дней до или 7 дней после применения препарата, ввиду возможного возникновения у животных побочных явлений и осложнений (диарея, анорексия, нефротические эффекты).

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо свиней – 10 суток. Мясо птицы – 7 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от 0 °С до +25 °С, в защищенном от света и влаги месте.

ТИЛМИТРИМ ПОРОШОК

Pulvis Tylmitrimum



Комплексный антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 75 мг тилмикозина, 100 мг энрофлоксацина, 50 мг триметоприма.

Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 200, 500, 1000 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тилмикозин – антибиотик из группы макролидов.

Энрофлоксацин – антибиотик из группы фторхинолонов.

Триметоприм – химиотерапевтический препарат из группы диаминопиримидинов.

Препарат активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, таких как *Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Ornithobacterium rhinotracheale, Pasteurella multocida, Escherichia coli, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium spp., Listeria monocytogenes, Corynebacterium spp., Pseudomonas spp., Haemophilus spp., Salmonella spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus spp., Shigella spp., Chlamidia spp.* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Тилмитрим порошок применяют сельскохозяйственной птице и свиньям при колибактериозе, сальмонеллезе, хронических респираторных заболеваниях, стрептококкозе, некротическом энтерите, гемофилезе, микоплазмозе, смешанных инфекциях и вторичных инфекциях при вирусных заболеваниях, возбудители которых чувствительны к тилмикозину, энрофлоксацину, триметоприму.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах:

- *птице:* 1 кг препарата на 1000 кг корма в течение 3-5 дней;
- *свиньям:* 0,3 г препарата на 10 кг массы тела животного (1 кг препарата на 1000-1500 кг корма) в течение 3-5 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять птице, чье яйцо используется в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Запрещается применение совместно с бактериостатическими антибиотиками (левомицетином, макролидами и тетрациклинами), теофиллином и нестероидными противовоспалительными средствами, препаратами магния и калия.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо свиней – 14 суток. Мясо птицы – 12 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от 0 °С до +25 °С, в защищенном от света и влаги месте.

ТИФАРМ

Typharmum

Антимикробный препарат широкого спектра действия



СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 900 мг тилозина тартрата.

Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 200, 500, 1000 , 10 000 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тилозина тартрат – антибиотик из группы макролидов.

Активен в отношении: *Mycoplasma spp., Chlamydia spp., Pasteurella multocida, Clostridium spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Brachyspira spp.* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Тифарм применяют сельскохозяйственной птице при респираторном микоплазмозе, индейкам при инфекционном синусите, свиньям при дизентерии и гастроэнтероколитах бактериальной этиологии, телятам при бронхопневмонии и других заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к тилозину.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах:

- *телятам (индивидуально, с кормом или питьевой водой):* 5-10 мг на 1 кг массы тела животного 2 раза в сутки до выздоровления (5-10 дней);
- *свиньям (индивидуально или групповым способом):* 0,05-0,11 г на 1 л питьевой воды в течение 3-5 дней;
- *птице:* 0,5 г на 1 л питьевой воды в течение 3-5 дней.

Птице раствор готовят из расчета потребности в воде на одни сутки. Во время лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат.

Перед применением рекомендованную дозу препарата растворяют в небольшом количестве воды (воду добавляют к порошку), а затем разводят водой до необходимого количества.

Возможно использование препарата в смеси с кормом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата животным, имеющим индивидуальную чувствительность к тилозину.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не рекомендуется одновременное применение с препаратами из группы пенициллинов и цефалоспоринов, другими макролидами, фторхинолонами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо свиней – 7 суток. Мясо птиц – 5 суток. Мясо крупного рогатого скота – 14 суток. Яйцо – 5 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от 0 °С до +25 °С, в защищенном от света и влаги месте.

ЭНРОКС-80

Enrox-80

Антимикробный препарат широкого спектра действия



СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 800 мг энрофлоксацина.

Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 500, 1000 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Энрофлоксацин – антибиотик группы фторхинолонов.

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Mycoplasma spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella spp.*, *Enterobacter spp.*, *Campylobacter spp.*, *Haemophilus spp.*, *Proteus spp.*, *Chlamydia*, *Mycobacterium spp.* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Энрокс-80 применяют телятам, свиньям, птице при колибактериозе, сальмонеллезе, микоплазмозе, бронхопневмониях, энтеритах и других болезнях, вызванных микроорганизмами чувствительными к энрофлоксацину, а также для лечения свиней при атрофическом рините, энзоотической пневмонии и синдроме мастит-метрит-агалактия.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах:

- *телятам:* 3-5 мг энрофлоксацина на 1 кг массы тела животного 1 раз в сутки в смеси с кормом или водой в течение 3-5 дней;
- *птице (цыплятам-бройлерам, племенной птице, курам-несушкам, ремонтному молодняку):* 150 г препарата на 1 т корма или 1000 л питьевой воды в течение 5-7 дней. Раствор готовят из расчета потребности птицы в воде на одни сутки. В период лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат;
- *свиньям:* 3-5 мг энрофлоксацина на 1 кг массы тела животного или 6,5 г препарата на 1000 л питьевой воды в течение 3-7 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата птице, чье яйцо используется в пищу людям.

Запрещается применение беременным и лактирующим животным.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками групп макролидов, тетрациклина, амфеникола, нестероидными противовоспалительными средствами, теофилином.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 14 суток. Мясо птицы – 12 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от 0 °С до +25 °С, в защищенном от света и влаги месте.

ЭНРАСТИМ

Enrastimum



Высокоэффективный антимикробный препарат широкого спектра действия – отличный компонент антирезистентной программы

СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 80 мг энрамицина.

Препарат выпускают в пакетах из бумаги с полиэтиленовым покрытием по 100, 500, 1000, 5000, 20000, 25000 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Энрамицин – полипептид, который оказывает антибактериальное действие и предотвращает развитие *Clostridium perfringens* и некоторых других грамположительных бактерий, а также сдерживает развитие бактерий рода *Salmonella*, обитающих в кишечнике, путем ингибирования синтеза клеточных мембран (образование цепей пептидогликанов). Энрамицин не активен в отношении лакто- и бифидобактерий.

ПОКАЗАНИЯ

Энрастим назначают для лечения свиней и птицы при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, вызванных микроорганизмами, чувствительными к энрамицину.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в смеси с кормом в следующих дозах:

- *для птицы:*

Бройлеры (предстартер и стартер) 200 г/т комбикорма ;

Бройлеры (гровер и финишер) 150 – 200 г/т комбикорма;

Несушки племенного стада до 8 недель 150 – 200 г/т комбикорма;

Несушки племенного стада старше 8 недель 150 г/т комбикорма;

- *для свиней:*

Поросята подсосные 200 г/т комбикорма;

Поросята на доращивании 200 г/т комбикорма;

Основные свиноматки, хряки и ремонтные свинки, свиньи на откорме 150 г/т комбикорма;

Супоросные свиноматки, на последнем месяце беременности, лактирующие свиноматки 300 г/т комбикорма.

Для достижения максимального результата свиньям в первые 7 дней увеличивают дозировку препарата в 2 раза.

Продолжительность лечения всех видов животных – 10-15 дней.

При необходимости курс лечения повторяют.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещен к применению птице, чьё яйцо используется в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Энрастим совместим с антибактериальными средствами и кормовыми добавками.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо свиней и птицы – без ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от 0 °С до +25 °С, в защищенном от света и влаги месте.

ФЕНОКСИТИЛ 10%

Fenoxitylum 10%



Высокоэффективный антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 100 мг феноксиметилпенициллина калия.

Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 1000, 5000, 10000 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Феноксиметилпенициллин калия – β-лактамный антибиотик группы пенициллинов.

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий: *Streptococcus spp., Corynebacterium spp., Erysipelotrix rhusiopatiae, Listeria monocytogenes, Clostridium spp.,* умеренно активен к *Actinobacillus spp., Borrellia spp., Brucella spp., Haemophilus spp., Leptospira spp., Moraxella spp., Pasteurella multocida, Proteus spp.* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Фенокситил 10% применяют сельскохозяйственной птице (цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур-несушек, индейкам) при некротическом энтерите; свиньям при стрептококкозе, гемофилезе, лептоспирозе, актинобациллезной плевропневмонии, пастереллезе, клостридиозе, роже свиней; телятам при пастереллезе, бронхопнемонии, клостридиозе, а также при других патологиях органов дыхания и мочевыделительной системы, вызванных микроорганизмами, чувствительными к феноксиметилпенициллину.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в смеси с кормом или водой в следующих дозах:

- *телятам:* 0,5-1 г препарата на 10 кг массы тела животного 3 раза в сутки в течение 5-10 дней;
- *свиньям:* 1 г препарата на 10 кг массы тела животного или 2 кг препарата на 1 тонну корма или 1000 л питьевой воды в течение 5-10 дней;
- *сельскохозяйственной птице:* 1500 г препарата на 1000 л питьевой воды в течение 3-5 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата птице, чьё яйцо используется в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Запрещается совместное применение препарата с антибиотиками групп амфеникола, макролидами и линкозамидами, сульфаниламидами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 10 суток. Мясо птицы – 5 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от 0 °С до +25 °С, в защищенном от света и влаги месте.

ФЕНОКСИТИЛ 32,5%

Fenoxitylum 32,5%



Высокоэффективный антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 325 мг феноксиметилпенициллина калия.

Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 1000, 5000, 10000 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Феноксиметилпенициллин калия – β-лактамный антибиотик группы пенициллинов.

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий: *Streptococcus spp., Corynebacterium spp., Erysipelotrix rhusiopatiae, Listeria monocytogenes, Clostridium spp.,* умеренно активен к *Actinobacillus spp., Borrellia spp., Brucella spp., Haemophilus spp., Leptospira spp., Moraxella spp., Pasteurella multocida, Proteus spp.* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Фенокситил 32,5% применяют сельскохозяйственной птице (цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур-несушек, индейкам) при некротическом энтерите; свиньям при стрептококкозе, гемофилезе, лептоспирозе, актинобациллезной плевропневмонии, пастереллезе, клостридиозе, роже свиней, а также при других патологиях органов дыхания и мочевыделительной системы, вызванных микроорганизмами, чувствительными к феноксиметилпенициллину.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах:

- *сельскохозяйственной птице:* 500 г препарата на 1000 л питьевой воды в течение 3-5 дней.
- *свиньям:* 0,3 г препарата на 10 кг массы тела животного или 0,65 кг препарата на 1 т корма или 1000 л питьевой воды течение 5-10 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата птице, чьё яйцо используется в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Запрещается совместное применение препарата с антибиотиками групп амфеникола, макролидами и линкозамидами, сульфаниламидами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 10 суток. Мясо птицы – 5 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от 0 °С до +25 °С, в защищенном от света и влаги месте.

АЗАЛИЦИН

Azalycinum



Комплексный антибактериальный препарат с широким спектром противомикробного действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 100 мг азитромицина, 73 мг флуниксина меглумина.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50, 100, 200 мл и в полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Азитромицин – полусинтетический макролидный антибиотик, первый представитель подкласса азалидов.

Активен в отношении грамотрицательных микроорганизмов: *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Haemophilus spp.*, *Moraxella spp.*, *Bordetella spp.*, *Campylobacter spp.*, *Salmonella spp.*, *Escherichia coli*, *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus parasuis*, грамположительных микроорганизмов: *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Enterococcus faecalis*, *Erysipelothrix rhusiopathiae* и некоторых анаэробных микроорганизмов: *Clostridium perfringens*, *Fusobacterium necrophorum*, микоплазм (*Mycoplasma spp.*), хламидий (*Chlamydia spp.*), боррелий (*Borrelia spp.*).

Флуниксин меглумин – нестероидное противовоспалительное средство, оказывает анальгезирующее, противовоспалительное, жаропонижающее и антитоксическое действие.

ПОКАЗАНИЯ

Азалицин применяют крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям при респираторных, желудочно-кишечных, урогенитальных и других заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к азитромицину.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах:

- *крупному и мелкому рогатому скоту:* 1 мл на 20 кг массы тела животного внутримышечно, 1 раз в сутки в течение 2-3 дней;
- *свиньям:* 1 мл на 20 кг массы тела животного внутримышечно, 1 раз в сутки в течение 2-3 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не рекомендуется применять препарат беременным животным, хрякам-производителям, быкам-производителям, животным менее 6-недельного возраста, поросятам массой менее 6 кг.

Запрещается применять продуктивным животным, чьё молоко используется в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Запрещено совместное применение препарата с антибиотиками из групп пенициллинов, цефалоспоринов, линкозамидов, гепарином, сердечными гликозидами.

Не совмещать препарат с другими нестероидными противовоспалительными средствами, кортикостероидными препаратами.

Запрещается смешивать препарат в одном шприце с другими лекарственными средствами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо крупного рогатого скота и свиней – 40 суток.

Мясо мелкого рогатого скота – 35 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

АМОКСОЛ LA

Amoksolum LA





Антибактериальный препарат пролонгированного действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 150 мг амоксициллина (в форме амоксициллина тригидрата).

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50, 100, 200 мл и в полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Амоксициллин – полусинтетический антибиотик группы пенициллинов. Активен в отношении *Staphylococcus spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Corynebacterium spp.*, *Clostridium spp.*, *Campylobacter spp.*, *Brucella spp.*, *Salmonella spp.*, *Escherichia coli*, *Haemophilus spp.*, *Fusobacterium necrophorum*, *Proteus spp.* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Амоксол LA применяют крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям, собакам при острых и хронических патологиях желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей, мочеполовой системы, суставов, мягких тканей, копытец, кожи, при некробактериозе, атрофическом рините, синдроме ММА у свиней, для профилактики хирургических послеоперационных инфекций у непродуктивных животных, а также при других заболеваниях животных, вызванных микроорганизмами, чувствительными к амоксициллину.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах:

• *крупному и мелкому рогатому скоту*, *свиньям*, *собакам:* 1 мл на 10 кг массы тела животного, внутримышечно или подкожно.

При необходимости возможно повторное введение препарата через 48 часов.

Максимальный объем суспензии, введенный в одно место, не должен превышать крупному рогатому скоту – 20 мл, мелкому рогатому скоту – 4 мл, свиньям – 5 мл, собакам – 2,5 мл.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не рекомендуется применять Амоксол LA совместно с амфениколами (тиамфениколом, флорфениколом), антибиотиками группы пенициллина, цефалоспоринами и линкозамидами, фторхинолонами, а также смешивать в одном шприце с другими лекарственными средствами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 28 суток. Молоко – 8 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +15 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

ВИРУСИД

Virusidum



Антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 55 мг энрофлоксацина, 25 мг рибавирина и 10 мг триметоприма.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50, 100, 200 мл и в полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Энрофлоксацин – антибиотик из группы фторхинолонов.

Триметоприм – химиотерапевтический препарат из группы диаминопиримидинов.

Рибавирин – противовирусный препарат.

Препарат активен в отношении *Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp., Escherichia coli, Enterobacter spp., Campylobacter spp., Salmonella spp., Haemophilus spp., Proteus spp., Chlamydia spp., Staphylococcus spp., Mycoplasma spp., Mycobacterium spp.* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Вирусид применяют животным (телятам, ягнятам, козлятам, собакам и кошкам, свиньям) при респираторных (бронхопневмонии, пневмонии, атрофическом рините свиней) и желудочно-кишечных заболеваниях (гастроэнтерите, энтерите, колите), патологиях мочеполовой системы (синдроме мастит-метрит-агалактия, цистите, пиелонефрите), септицемии и других заболеваниях бактериальной, вирусной и смешанной этиологии у животных, возбудители которых чувствительны к компонентам препарата.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят 1 раз в день в течение 3-5 дней в следующих дозах:

- *телятам, ягнятам, козлятам, собакам и кошкам:* 1 мл на 10 кг массы тела животного, подкожно;
- *свиньям:* 1,5 мл на 10 кг массы тела животного, внутримышечно.

В одно место рекомендуется вводить не более 2,5 мл препарата мелким животным, ягнятам, козлятам, поросятам и 5 мл телятам, свиньям.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не назначают препарат беременным и лактирующим животным, при нарушениях развития хрящевой ткани, поражениях нервной системы, сопровождающихся судорогами, щенкам мелких до 8, средних до 12 и крупных пород собак до 18-месячного возраста и животным, имеющим повышенную чувствительность к фторхинолонам.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками групп макролидов, тетрациклина, амфеникола, нестероидными противовоспалительными средствами, теофилином.

Запрещается смешивать препарат в одном шприце с другими лекарственными средствами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 14 дней.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

ГАМИТРОН

Gamitronum



Антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 150 мг гамитромицина.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50, 100, 200 мл и полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Гамитромицин – азалид, полусинтетический макролидный антибиотик. Активен у крупного рогатого скота в отношении *Mycoplasma bovis, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni, Bordetella bronchiseptica, Fusobacterium necrophorum;* у свиней – *Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis, Bordetella bronchiseptica, Mycoplasma hyopneumoniae;* у овец – *Dichelobacter nodosus, Fusobacterium necrophorum.*

ПОКАЗАНИЯ

Гамитрон назначают крупному рогатому скоту при респираторных заболеваниях и инфекционном пододерматите, овцам – при инфекционном пододерматите, свиньям – при респираторных заболеваниях, а также других заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к гамитромицину.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах:

- *крупному рогатому скоту и овцам:* 1 мл на 25 кг массы тела животного, однократно, подкожно в переднюю часть плеча;
- *свиньям (поросятам):* 1 мл на 25 кг массы тела животного, однократно, внутримышечно.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается использовать препарат стельным коровам и лактирующим животным. Данные о применении препарата супоросным свиноматкам и суяглым овцам отсутствуют, применение возможно по показаниям под контролем ветеринарного врача.

Запрещается применять препарат животным, имеющим повышенную чувствительность к компонентам препарата.

Запрещено использовать препарат продуктивным животным, чье молоко используется в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Запрещается применять препарат совместно с препаратами группы макролидов и линкозамидов.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо крупного рогатого скота – 70 дней. Мясо овец – 50 дней. Мясо свиней – 40 дней.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

ГЕНТАН 4%

Gentanum 4%



Антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 40 мг гентамицина (в форме гентамицина сульфата).

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50, 100, 200 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Гентамицина сульфат – антибиотик из группы аминогликозидов.

Активен в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, в том числе *Escherichia coli, Enterobacter spp., Klebsiella spp., Salmonella spp., Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Pasteurella spp., Staphylococcus aureus, Mycoplasmas spp.* и др.

Препарат не действует на анаэробные бактерии, вирусы, простейших и грибы, оказывает слабое действие на отдельные штаммы *Streptococcus spp.*

ПОКАЗАНИЯ

Гентан 4% назначают крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям, лошадям, собакам, кошкам при респираторных и желудочно-кишечных заболеваниях, сепсисе, перитоните, менингите, пиелонефрите, артритах, дерматите (у собак) и других заболеваниях бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к гентамицину сульфату.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют внутримышечно в следующих дозах:

- *крупному рогатому скоту и мелкому рогатому скоту (овцам):* 0,7 мл на 10 кг массы тела животного 2 раза в сутки в течение 3-5 дней;
- *свиньям:* 1,0 мл на 10 кг массы тела животного 2 раза в сутки в течение 1-3 дней;
- *лошадям:* 0,6 мл на 10 кг массы тела животного 2 раза в сутки в течение 3-5 дней;
- *собакам и кошкам:* 0,6 мл на 10 кг массы тела животного 2 раза в сутки в течение 3-7 дней.

Новорожденным животным в течение первых двух дней жизни назначают только половину рекомендованной дозы.

Максимальный объем раствора для введения в одно место крупному рогатому скоту и лошадям не должен превышать 20 мл, свиньям – 10 мл, овцам – 5 мл, собакам и кошкам – 2,5 мл.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата животным с тяжелыми нарушениями функций почек, при повышенной чувствительности к гентамицину, в период беременности.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не рекомендуется совместное применение препарата с антибиотиками, содержащими в своем составе стрептомицин, канамицин и неомицин, а также с диуретиками и миорелаксантами. Препарат нельзя смешивать в одном шприце с другими лекарственными препаратами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней и овец – 21 день. Молоко – 72 часа.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

ГЕНТАН 10%

Gentanum 10%



Антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 100 мг гентамицина (в форме гентамицина сульфата).

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50, 100, 200 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Гентамицина сульфат – антибиотик из группы аминогликозидов.

Активен в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, в том числе *Escherichia coli, Enterobacter spp., Klebsiella spp., Salmonella spp., Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Pasteurella spp., Staphylococcus aureus, Mycoplasmas spp.* и др.

Препарат не действует на анаэробные бактерии, вирусы, простейших и грибы, оказывает слабое действие на отдельные штаммы *Streptococcus spp.*

ПОКАЗАНИЯ

Гентан 10% назначают крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям, лошадям, собакам, кошкам при респираторных и желудочно-кишечных заболеваниях, сепсисе, перитоните, менингите, пиелонефрите, при артритах, дерматите (у собак) и других заболеваниях бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к гентамицину сульфату.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют внутримышечно в следующих дозах:

- *крупному рогатому скоту, телятам, свиньям:* 0,2-0,25 мл на 10 кг массы тела животного 2 раза в сутки в течение 5-7 дней;
- *лошадям и мелкому рогатому скоту:* 0,15-0,2 мл на 10 кг массы тела животного 2 раза в сутки в течение 5-7 дней;
- *собакам и кошкам:* 0,2-0,3 мл на 10 кг массы тела животного 2 раза в сутки в течение 5-7 дней.

Новорожденным животным в течение первых двух дней жизни назначают только половину рекомендованной дозы.

Максимальный объем раствора для введения в одно место крупному рогатому скоту и лошадям не должен превышать 20 мл, свиньям – 10 мл, овцам – 5 мл, собакам и кошкам – 2,5 мл.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата животным с тяжелыми нарушениями функций почек, при повышенной чувствительности к гентамицину, в период беременности.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не рекомендуется совместное применение препарата с антибиотиками, содержащими в своем составе стрептомицин, канамицин и неомицин, а также с диуретиками и миорелаксантами. Препарат нельзя смешивать в одном шприце с другими лекарственными препаратами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и свиней – 21 день. Молоко – 10 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

ДОКСИФЛОКС

Doxyfloxum



Комплексный антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 50 мг доксициклина гиклата, 100 мг флорфеникола и 9 мг флуниксина меглумина.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50, 100, 200 мл, в полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Доксициклин – полусинтетический антибиотик группы тетрациклинов, производное окситетрациклина. Активен в отношении грамположительных микроорганизмов: *Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Listeria monocytogenes, Corynebacterium spp., Erysipelothrix rhusiopathie, Clostridium spp.* и грамотрицательных микроорганизмов: *Salmonella spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Campylobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, Bordetella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Brucella spp.* а также *Chlamydia spp., Rickettsia spp., Mycoplasma spp., Borrelia spp., Brucella spp.* и др.

Флорфеникол – синтетический антибиотик, производное тиамфеникола, в молекуле которого гидроксильная группа замещена атомом фтора.

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: *Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Escherichia coli, Salmonella spp., Pasteurella multocida, Haemophilus spp., Proteus spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Bordetella spp.,* а также *Mycoplasma spp.*

Флуниксин меглумин – нестероидное противовоспалительное средство, оказывает анальгезирующее, противовоспалительное, жаропонижающее и антитоксическое действие.

ПОКАЗАНИЯ

Доксифлокс применяют телятам, овцам и свиньям при респираторных и желудочно-кишечных заболеваниях бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к доксициклину и флорфениколу (колибактериоз, сальмонеллез, гемофиллезный полисерозит, микоплазмоз, пастереллез, листериоз и др.).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят 1 раз в день, внутримышечно в течение 3-5 дней в следующих дозах:

- *телятам:* 1,0 мл на 7,5-10 кг массы тела животного;
- *свиньям:* 1,0 мл на 10 кг массы тела животного;
- *овцам:* 1,0 мл на 7,5 кг массы тела животного.

В одно место рекомендуется вводить не более 2,5 мл препарата ягнятам и поросятам и 5 мл препарата телятам, свиньям и овцам.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата при тяжелых поражениях системы кроветворения, сердца, печени и почек. Не рекомендуется применять при индивидуальной повышенной чувствительности к флорфениколу, доксициклина гиклату и флуниксину меглумину.

Не применять препарат самкам в период беременности и лактации, хрякам и быкам-производителям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками групп пенициллинов, полимиксинов; препаратами, содержащими соединения кальция, алюминия и магния; с другими нестероидными противовоспалительными средствами; кортикостероидными препаратами; средствами, содержащими тиамфеникол и хлорамфеникол.

Запрещается смешивать препарат в одном шприце с другими лекарственными средствами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо свиней – 34 дня. Мясо телят – 40 дней. Мясо овец – 30 дней.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

ДРАКСОН

Draxonum



Антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 100 мг тулатромицина.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50, 100, 200 мл и в полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тулатромицин – полусинтетический антибиотик группы макролидов.

Активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus, Haemophilus parasuis, Mycoplasma bovis, Mycoplasma hyopneumonia, Actinobacillus pleuropneumoniae, Moraxella bovis* и других.

ПОКАЗАНИЯ

Драксон применяют крупному рогатому скоту и свиньям при заболеваниях бактериальной этиологии (пастереллез, микоплазмоз, актинобациллез, стрептококкоз, бронхопневмонии), вызываемых микроорганизмами чувствительными к тулатромицину.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах:

- *свиньям:* 1 мл на 40 кг массы тела животного, однократно, внутримышечно в область шеи;
- *крупному рогатому скоту:* 1 мл на 40 кг массы тела животного, однократно, подкожно.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять препарат продуктивным животным, чьё молоко используется в пищу людям.

Запрещено применять стельным коровам и тёлкам в течение 2 месяцев до ожидаемого срока отела.

Препарат противопоказан при повышенной индивидуальной чувствительности животных к компонентам препарата.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не рекомендуется совместное применение препарата с другими антибиотиками группы макролидов и линкозамидов.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо крупного рогатого скота – 64 суток. Мясо свиней – 68 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

ЛЕВИТ 50

Levitum 50



Антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 50 мг левофлоксацина.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 20, 50, 100, 200 мл и в полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Левофлоксацин – антибиотик группы фторхинолонов.

Активен в отношении *Pseudomonas spp., Klebsiella spp., Escherichia coli, Enterobacter spp., Campylobacter spp., Salmonella spp., Haemophilus spp., Proteus spp., Chlamydia spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Mycoplasma spp.* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Левит 50 применяют при колибактериозе, пастереллезе, сальмонеллезе, микоплазмозе, стафилококкозе, роже свиней, бордетеллезе свиней, смешанных инфекциях и других заболеваниях, вызванных возбудителями, чувствительными к левофлоксацину у свиней и крупного рогатого скота.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют внутримышечно в следующих дозах:

- *свиньям:* 1 мл на 10 кг массы тела животного, 1 раз в день в течение 3-5 дней;
- *крупному рогатому скоту:* 1 мл на 10 кг массы тела животного, 1 раз в день в течение 3-5 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат противопоказан животным при нарушениях функции почек, печени, повышенной чувствительности к фторхинолонам.

Запрещается применять животным в период лактации.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Противопоказано совместное применение препарата с бактериостатическими антибиотиками (тетрациклинами, макролидами и амфениколами), теофиллином, стероидами, непрямыми антикоагулянтами, препаратами магния.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 9 дней. Молоко – 96 часов

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

При хранении при низких температурах (от +5 °С до +15 °С) допускается выпадение осадка, который исчезает при повышении температуры в течение 30 минут – 60 минут.

ЛЕВИТ 100

Levitum 100

Антибактериальный препарат широкого спектра действия



СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 100 мг левофлоксацина.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 20, 50, 100, 200 мл и в полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Левофлоксацин относится к группе фторхинолонов. Препарат активен в отношении *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella spp.*, *Escherichia coli*, *Enterobacter spp.*, *Campylobacter spp.*, *Salmonella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Proteus spp.*, *Chlamydia spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.* и *Mycoplasma spp.*

ПОКАЗАНИЯ

Левит 100 применяют при колибактериозе, пастереллезе, сальмонеллезе, микоплазмозе, стафилококкозе, роже свиней, бордетеллезе свиней, смешанных инфекциях и других заболеваниях, вызванных возбудителями, чувствительными к левофлоксацину у свиней и крупного рогатого скота.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют:

- *свиньям и крупному рогатому скоту* внутримышечно в дозе 1 мл на 20 кг массы тела животного, 1 раз в день в течение 3-5 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат противопоказан животным при нарушениях функции почек, печени, повышенной чувствительности к фторхинолонам.

Запрещается применять препарат лактирующим животным.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Противопоказано совместное применение препарата с бактериостатическими антибиотиками (тетрациклинами, макролидами и амфениколами), теофилином, стероидами, непрямыми антикоагулянтами, препаратами магния.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 9 дней. Молоко – 96 часов

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

При хранении при низких температурах (от +5 °С до +15 °С) допускается выпадение осадка, который исчезает при повышении температуры в течение 30 минут – 1 часа.

ЛЕВОВИРИН

Levovirinum



Комплексный противомикробный и противовирусный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 50 мг левофлоксацина и 25 мг рибавирина.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 20, 50, 100, 200 мл и в полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Левофлоксацин относится к группе фторхинолонов и обладает широким спектром противомикробного действия. Активен в отношении *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella spp.*, *Escherichia coli*, *Enterobacter spp.*, *Campylobacter spp.*, *Salmonella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Proteus spp.*, *Chlamydia spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Mycoplasma spp.*, *Mycobacterium spp.* и др.

Рибавирин – синтетический аналог нуклеозидов с выраженным противовирусным действием. Активен против ДНК- и РНК-содержащих вирусов.

ПОКАЗАНИЯ

Левовирин применяют крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям, собакам и кошкам при колибактериозе, сальмонеллезе, стафилококкозе, стрептококкозе, респираторных (бронхопневмония, пневмония), желудочно-кишечных заболеваниях (гастроэнтерит, энтерит, колит), патологии мочеполовой системы (цистит, пиелонефрит), септицемии, а также при атрофическом рините, энзоотической пневмонии и синдроме мастит-метрит-агалактии у свиней, и других заболеваниях бактериальной, вирусной и смешанной этиологии у животных, возбудители которых чувствительны к компонентам препарата.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах:

- *телятам, ягнятам, козлятам:* 1 мл на 10 кг массы тела животного, подкожно;
- *свиньям:* 1 мл на 10 кг массы тела животного, внутримышечно;
- *собакам и кошкам:* 1 мл на 10 кг массы тела животного, подкожно.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять препарат беременным и лактирующим животным, при нарушениях развития хрящевой ткани, поражениях нервной системы, сопровождающихся судорогами, щенкам мелких до 8-, средних до 12-и крупных пород собак до 18-месячного возраста и животным, имеющим повышенную чувствительность к фторхинолонам и рибавирину.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками групп макролидов, тетрациклинов, амфениколов, нитрофуранами, нестероидными противовоспалительными средствами, теофилином.

Запрещено смешивать препарат в одном шприце с другими лекарственными средствами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 14 дней.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

ЛИНКОМИЦИН 10%

Lincomicynum 10%



Антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 100 мг линкомицина (в форме гидрохлорида).

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50, 100, 200 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Линкомицина гидрохлорид – антибиотик из группы линкозамидов, продуцируемый *Streptomyces lincolniensis*. Активен в отношении большинства грамположительных микроорганизмов, в том числе *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Streptococcus pneumonia*, *Clostridium perfringens*, *Clostridium tetani*, *Corynebacterium spp.*, *Haemophilus influenzae*, *Actinomyces spp.*, *Branchyspira hyodysenteria*, а также в отношении *Mycoplasma spp.*

ПОКАЗАНИЯ

Линкомицин 10% применяют свиньям, телятам, собакам и кошкам при септицимии, респираторных заболеваниях, актиномикозе, полиартритах, абсцессах, гнойных дерматитах, остеомиелите, заболеваниях мочевыделительной системы и других заболеваниях, вызванных чувствительными к антибиотику микроорганизмами, а также при энзоотической пневмонии и дизентерии у свиней.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют (1 раз в сутки, внутримышечно) в следующих дозах:

- *свиньям:* 1 мл на 10 кг массы тела животного в течение 3-7 дней;
- *телятам:* 1 мл на 10 кг массы тела животного в течение 3-4 дней;
- *собакам , кошкам:* 0,2 мл на 1 кг массы тела животного в течение 3-7 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещено применение препарата лошадям, жвачным животным (с развитым рубцовым пищеварением в возрасте старше 6 месяцев), кроликам, морским свинкам и животным, имеющим индивидуальную повышенную чувствительность к линкомицину.

Не применять животным в период беременности и лактации, а также при тяжелых нарушениях функции печени и почек.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не допускается одновременное применение препарата с антибиотиками из групп макролидов и пенициллинов.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 7 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

МАРБОФЛОКСАЦИН 2%

Marbofloxacinum 2%



Антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 20 мг марбофлоксацина.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50, 100, 200 мл и полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Марбофлоксацин – синтетическое противомикробное средство из группы фторхинолонов. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в т.ч. *Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Escherichia coli, Pasteurella multocida, Manncheimia haemolytica, Haemophilus spp., Moraxella spp., Actinobacillus pleuropneumoniae, Somonella spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus spp., Erysipelotrix rhusopatiae, Bardetella spp.,* а также микоплазм *Mycoplasma bovis, Mycoplasma hyopneumoniae* и других.

ПОКАЗАНИЯ

Марбофлоксацин 2% применяют молодняку крупного рогатого скота и свиней при сальмонеллезе, кампилобактериоз, микоплазмозе, пастереллезе, гемо-филезе, стрептококкозе, бордетеллезе, синдроме ММА и роже свиней , со-бакам и кошкам при респираторных заболеваниях, инфицированных ранах, абсцессах, при инфекциях мочевыделительной системы, а также при других заболеваниях, вызываемых микроорганизмами, чувствительными к марбо-флоксацину (клебсиеллы, протей, энтеробактерии и др.).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применять в следующих дозах:

- *телятам:* 1 мл на 10 кг массы тела животного подкожно или внутримышечно, один раз в сутки в течение 3-5 дней;
- *свиньям:* 1 мл на 10 кг массы тела животного внутримышечно, один раз в сутки в течение 3-5 дней;
- *собакам (раневые инфекции, абсцессы):* 1 мл на 10 кг массы тела животного подкожно, однократно;
- *собакам (инфекции мочевыделительной системы, респираторные заболевания):* 1 мл на 10 кг массы тела животного подкожно, однократно.
- *кошкам (раневые инфекции, абсцессы, респираторные заболевания):* 0,5 мл на 5 кг массы тела животного подкожно, один раз в сутки в течение 3-5 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять препарат в случае повышенной индивидуальной чувствительности животных к компонентам препарата.

Запрещено применять щенкам крупных пород собак до 18-месячного возраста, остальным породам собак – до 12-месячного возраста.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками групп макролидов, тетрациклинов, амфениколами, нитрофуранами, нестероидными противовоспалительными средствами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо крупного рогатого скота – 8 суток. Мясо свиней – 9 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

МАРБОФЛОКСАЦИН 10%



Marbofloxacinum 10%

Антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 100 мг марбофлоксацина.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50, 100, 200 мл, в полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Марбофлоксацин – синтетическое химиотерапевтическое средство из группы фторхинолонов.

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в т.ч. *Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae, Serratia marcescens, Morganella morganii, Proteus spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Moraxella spp., Pseudomonas spp., Brucella canis, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Enterobacter spp.*, а также *Mycoplasma spp.*

ПОКАЗАНИЯ

Марбофлоксацин 10% применяют крупному рогатому скоту и свиньям при саль-монеллезе, кампилобактериозе, микоплазмозе, пастереллезе, гемофилезе, стрептококкозе, бордетеллезе, мастите у крупного рогатого скота, синдроме ММА и роже свиней, а также при других заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к марбофлоксацину (клебсиеллы, протей, энте-робактеры и др.).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах:

- *крупному рогатому скоту:* 1 мл на 50 кг массы тела животного, подкожно или внутримышечно, один раз в сутки, курс лечения 3-5 суток. Возможно, однократное применение препарата крупному рогатому скоту внутримышечно в дозе 2 мл препарата на 25 кг массы тела животного;
- *свиньям:* 1 мл на 50 кг массы тела животного, внутримышечно, один раз в сутки, курс лечения 3 суток.

Максимальный объем препарата для введения в одно место не должен превышать 20 мл.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат противопоказан при повышенной индивидуальной чувствительности животных к компонентам препарата.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Запрещено совместное применение препарата с антибиотиками групп макролидов, тетрациклина, нестероидными противовоспалительными средствами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо крупного рогатого скота – 8 суток. Мясо свиней – 9 суток. Молоко продуктивных животных запрещается использовать для пищевых целей в течение 72 часов после последнего применения препарата.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

МЕТАСУЛЬФ

Metasulfum



Антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 100 мг сульфаметоксипиридазина, 100 мг сульфаметоксазола, 40 мг триметоприма.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 20, 50, 100, 200 мл и в полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Метасульф – комплексный противомикробный препарат производных сульфаниламида и триметоприма, оказывающий бактерицидное действие. Эффективен в отношении *Escherichia coli*, *Clostridium spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Actinomyces*, *Eimeria spp.*, *Haemophillus spp.*, *Toxoplasma* и др.

Сульфаниламиды обладают химиотерапевтической активностью при заболеваниях, вызванных грамположительными и грамотрицательными бактериями, некоторыми простейшими.

Триметоприм – химиотерапевтическое средство, оказывающее бактерицидное действие в отношении эшерихий, стафилококков, стрептококков, сальмонелл и др.

ПОКАЗАНИЯ

Метасульф применяют крупному рогатому скоту, овцам, свиньям, собакам и кошкам при колибактериозе, пастереллезе, сальмонеллезе, микоплазмозе, стафилококкозе, эймериозе, смешанных бактериальных инфекциях и других заболеваниях, вызванных возбудителями, чувствительными к компонентам препарата.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют 1-2 раза в сутки в течение 3-7 дней в следующих дозах:

- *крупному рогатому скоту, овцам:* 1 мл на 10 кг массы тела животного;
- *свиньям:* 1 мл на 10 кг массы тела животного;
- *кошкам и собакам:* 0,05-0,1 мл на 1 кг массы тела животного.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается использовать препарат лактирующим животным в период получения продукции и козам.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не рекомендуется применять препарат в сочетании с препаратами серы и производными парааминобензойной кислоты.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 28 дней. Молоко – 10 дней.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

МИКОЗИН

Micosinum



Антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 300 мг тилмикозина.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50, 100, 200 мл и в полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тилмикозин – полусинтетический антибиотик из группы макролидов. Активен в отношении грамположительных, таких как *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Corynebacterium spp.* и др., и грамотрицательных микроорганизмов, таких как *Pasteurella spp.*, *Clostridium spp.* и др., актиномицет, а именно *Actinobacillus pleuropneumoniae* и микоплазм.

ПОКАЗАНИЯ

Микозин применяют крупному рогатому скоту при респираторных заболеваниях, пастереллезе, микоплазмозе, стрептококкозе, некробактериозе и других заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к тилмикозину.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в дозе 1 мл на 30 кг массы тела животного подкожно, однократно.

В одно место рекомендуется вводить не более 15 мл препарата.

При некробактериозе препарат вводят в дозе 0,5 мл на 30 кг массы тела животного подкожно, однократно.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата другим видам животных, лактирующим коровам, коровам в течение 60 дней до родов, с осторожностью во время беременности.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не рекомендуется одновременное применение с препаратами из групп пенициллинов и цефалоспоринов, аминогликозидами, с антагонистами адреналина или β-адренергическими антагонистами, такими как пропранолол.

Не применять животным, имеющим индивидуальную чувствительность к макролидам.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо крупного рогатого скота – 60 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

РЕСПИРОН

Respironum



Комплексный антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 300 мг флорфеникола и 16,5 мг флуниксина меглумина.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50, 100, 200 мл и в полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Флорфеникол – синтетический антибиотик, производное тиамфеникола, в молекуле которого гидроксильная группа замещена атомом фтора. Флорфеникол – бактериостатический антибиотик широкого спектра действия, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus spp.*, *Proteus spp.*, *Enterobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Bordetella spp.*, а также в отношении *Mycoplasma spp.*

Флуниксин меглумин – нестероидное противовоспалительное средство. Оказывает анальгезирующее, противовоспалительное, жаропонижающее и антитоксическое действие.

ПОКАЗАНИЯ

Респирон применяют молодняку крупного рогатого скота при колибактериозе, сальмонеллезе, стафилококкозе, стрептококкозе и других заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к флорфениколу.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят однократно подкожно в область шеи в дозе 2 мл на 15 кг массы тела животного.

При необходимости введение препарата повторяют через 48 часов.

В одно место рекомендуется вводить не более 10 мл препарата.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата при тяжелых поражениях системы кроветворения, сердца, печени и почек, а также при индивидуальной повышенной чувствительности к флорфениколу и флуниксину, с другими нестероидными противовоспалительными средствами, кортикостероидными препаратами.

Запрещается применение препарата стельным животным, лактирующим коровам, молоко которых используется в пищу людям, быкам-производителям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не рекомендуется применять с другими противовоспалительными средствами, кортикостероидными препаратами.

Запрещено смешивать препарат в одном шприце с другими лекарственными средствами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 64 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

РЕСПИРОН ПИГ

Respiron Pig



Комплексный антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 300 мг флорфеникола и 36,5 мг флуниксина меглумина.

Препарат выпускают в флаконах по 50, 100, 200 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Флорфеникол – синтетический антибиотик, производное тиамфеникола, в молекуле которого гидроксильная группа замещена атомом фтора. Флорфеникол – бактериостатический антибиотик широкого спектра действия, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus spp.*, *Proteus spp.*, *Enterobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Bordetella spp.*, а также в отношении *Mycoplasma spp.*

Флуниксин меглумин – нестероидное противовоспалительное средство. Оказывает анальгезирующее, противовоспалительное, жаропонижающее и антитоксическое действие.

ПОКАЗАНИЯ

Респирон Пиг применяют свиньям при колибактериозе, сальмонеллезе, стафилококкозе, респираторных, желудочно-кишечных и других заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к флорфениколу.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят внутримышечно в дозе 1 мл на 10 кг массы тела животного однократно или 1 мл на 20 кг массы тела двукратно с интервалом 48 часов.

При необходимости введение препарата повторяют через 48-72 ч.

В одно место рекомендуется вводить не более 10 мл препарата.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата при тяжелых поражениях системы кроветворения, сердца, печени и почек, а также при индивидуальной повышенной чувствительности к флорфениколу и флуниксину.

Не применять препарат супоросным животным.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Запрещается применение препарата с другими нестероидными противовоспалительными средствами, кортикостероидными препаратами, средствами, содержащими тиамфеникол и хлорамфеникол, а также смешивать препарат в одном шприце с другими лекарственными средствами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо свиней – 10 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

СПЕЦИН ЛА

Specinum LA



Комплексный противомикробный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 100 мг спектиномицина и 50 мг линкомицина.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50, 100, 200 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Линкомицин – антибиотик из группы линкозамидов. В терапевтических дозах действует на микробную клетку бактериостатически. Действует преимущественно на грамположительные микроорганизмы.

Спектиномицин – аминоциклический антибиотик, оказывающий бактериостатическое действие. Активен преимущественно в отношении грамотрицательных микроорганизмов.

Входящие в состав препарата компоненты активны в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Bacteroides spp.*, *Fusobacterium spp.*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Bordetella spp.* и др., а также *Mycoplasma spp.*, *Branchyspira hyodysenteria* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Специн ЛА применяют крупному рогатому скоту, свиньям, овцам, кошкам, собакам, при желудочно-кишечных и респираторных заболеваниях, вызванных возбудителями, чувствительными к компонентам препарата (колибактериоз, сальмонеллез, пастереллез, бордетеллиоз и др.).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах:

- *свиньям:* 1,0 мл на 10 кг массы тела животного один раз в день в течение 3-7 суток, внутримышечно;
- *крупному рогатому скоту:* 1,0 мл на 10 кг массы тела животного один раз в день в течение 4 суток, внутримышечно;
- *овцам* 1,0 мл на 10 кг массы тела животного один раз в день в течение 3 суток, внутримышечно;
- *собакам и кошкам:* 1,0 мл на 5 кг массы тела животного один раз в день в течение 3-5 суток,внутримышечно.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять препарат при патологии печени и почек, при повышенной чувствительности к линкомицину и/или спекциномицину.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Запрещается совместное применение препарата с антибиотиками групп пенициллинов, цефалоспоринов, производными хинолона.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 21 сутки. Молоко – 5 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

ТИАМОЛ

Tyamolum



Антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 100 мг тиамулина (в форме тиамулина гидрогенфумарата).

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50, 100, 200 мл, полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тиамулин – полусинтетический дериват дитерпенового антибиотика плевромутилина.

Активен в отношении грамположительных *(Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria spp.)* и грамотрицательных микроорганизмов *(Pasteurella spp., Fusobacterium necrophorum, Campylobacter coli, Lawsonia intracellularis, Brachyspira hyodysenteriae, Brachyspira pilosicoli)* и микоплазм *(Mycoplasma bovis, Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma hyorhinis, Mycoplasma hyosynoviae, Mycoplasma synoviae, Ureaplasma spp.)*, боррелий, лептоспир *(Leptospira spp.)*, хламидий *(Chlamydia spp.)*. К тиамулину не чувствительны бактерии семейства *Enterobacteriaceae*, в том числе *Salmonella spp., E. coli*, синегнойная палочка, грибы и вирусы.

ПОКАЗАНИЯ

Тиамол применяют свиньям и молодняку крупного рогатого скота при инфекционных заболеваниях респираторного и желудочно-кишечного тракта бактериальной и микоплазменной этиологии, вызванных чувствительными к тиамулину микроорганизмами.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах:

- *телятам:* 1,0-1,5 мл на 10 кг массы тела животного, внутримышечно, 1 раз в день в течение 5-7 дней;
- *свиньям:*

– при дизентерии и энтероколитах бактериальной этиологии: 1 мл на 12,5 кг массы тела животного, внутримышечно, однократно (в тяжелых случаях повторить инъекцию через 24 часа);

– при энзоотической пневмонии и артрите микоплазменной этиологии: 1,5 мл на 12,5 кг массы тела животного, внутримышечно, 1 раз в сутки в течение 3 дней;

– при актинобациллярной плевропневмонии: 2 мл на 12,5 кг массы тела животного, внутримышечно, 1 раз в сутки в течение 3 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат противопоказан при повышенной индивидуальной чувствительности животных к макролидам, поражениях печени.

Препарат не рекомендуется применять свиноматкам в течение первого месяца супоросности, племенным хрякам.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Запрещается одновременное использование препарата с ионофорными кокцидиостатиками (монензин, салиномицин и наразин), а также на протяжении 7 дней до и 7 дней после прекращения использования ионофорных кокцидиостатиков.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 10 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

ТИАМ-ТИЛ

Tyam-tilum



Комплексный антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 87,5 мг тиамулин гидрогенфумарата, 62,5 мг тилозина тартрата.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50, 100, 200 мл, полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тиамулин – полусинтетический дериват дитерпенового антибиотика плевромутилина.

Активен в отношении грамположительных *(Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria spp.)* и грамотрицательных микроорганизмов *(Pasteurella spp., Fusobacterium necrophorum, Campylobacter coli, Lawsonia intracellularis, Brachyspira hyodysenteriae, Brachyspira pilosicoli)* и микоплазм *(Mycoplasma bovis, Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma hyorhinis, Mycoplasma hyosynoviae, Mycoplasma synoviae, Ureaplasma spp.)*, боррелий, лептоспир *(Leptospira spp.)*, хламидий *(Chlamydia spp.)*. К тиамулину не чувствительны бактерии семейства *Enterobacteriaceae*, в том числе *Salmonella spp., E. coli,* синегнойная палочка, грибы и вирусы.

Тилозин – антибиотик из группы макролидов.

Активен в отношении грамположительных и некоторых грамотрицательных бактерий, в том числе *Escherichia coli, Bacillus anthracis, Pasteurella spp., Haemophilus spp., Leptospira spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Erysipelothrix spp., Corynebacterium spp., Mycoplasma spp., Chlamydia spp., Brachyspira spp.*

ПОКАЗАНИЯ

Тиам-тил применяют свиньям при роже, дизентерии, илеите, лептоспирозе, листериозе, колибактериозе, пастереллезе, сальмонеллезе, инфекционном гастроэнтерите, атрофическом рините, энзоотической пневмонии, актинобациллярной плевропневмонии, микоплазменном артрите; крупному рогатому скоту при бронхопневмонии, дизентерии, перитоните, метрите, гнойном артрите, лептоспирозе, послеродовых осложнениях и хирургических инфекциях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к тиамулину и тилозину.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах:

- *крупному рогатому скоту:* 1 мл на 10 кг массы тела животного, внутримышечно, 1 раз в день в течение 3-5 дней;
- *свиньям:* 1 мл на 10 кг массы тела животного, внутримышечно, 1 раз в день в течение 3-5 суток. При энзоотической пневмонии, микоплазменном артрите свиней, указанную дозу увеличивают в 1,5-2 раза. При лечении свиней больных дизентерией или илеитом, через 7-10 суток целесообразно повторить обработку препаратом.

Перед применением препарат необходимо подогреть до 25-30 °С.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять препарат свиноматкам в течение первого месяца супоросности.

Препарат противопоказан при повышенной индивидуальной чувствительности животных к компонентам препарата.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Запрещается одновременное использование препарата с ионофорными кокцидиостатиками (монензин, салиномицин и наразин), а также на протяжении 7 дней до и 7 дней после прекращения использования ионофорных кокцидиостатиков.

Запрещается применять препарат одновременно с пенициллинами, цефалоспоринами и линкомицином, поскольку снижается антибактериальный эффект.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 10 суток. Молоко – 5 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

ТИЛОСТИН

Tylostinum



Комплексный антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 200 мг тилозина, 1000000 МЕ колистина сульфата.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 10, 20, 50, 100 мл и в полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тилозин – антибиотик из группы макролидов, активен в отношении большинства грамположительных и некоторых грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Corynebacterium spp.*, *Clostridium spp.*, *Pasteurella spp.*, *Chlamydia spp.* и *Mycoplasma spp.*

Колистина сульфат – смесь сульфатных полипептидов, продуцируемых некоторыми штаммами *Bacillus polymyxia*. Обладает сильным бактерицидным действием в отношении большинства аэробных грамотрицательных микроорганизмов (узкий спектр действия). Оказывает бактерицидное действие в отношении таких микроорганизмов, как *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Haemophilus spp.* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Тилостин применяют при желудочно-кишечных и легочных заболеваниях у молодняка крупного рогатого скота; энзоотической пневмонии, артритах, дизентерии, атрофическом рините у свиней и других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к компонентам препарата.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат назначают в течение 3-5 дней в следующих дозах:

- *крупному рогатому скоту:* 0,2-0,5 мл на 10 кг массы тела животного, один раз в сутки, внутримышечно;
- *свиньям:* 0,1-0,5 мл на 10 кг массы тела животного, один раз в сутки, внутримышечно.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять препарат животным, имеющим индивидуальную чувствительность к макролидам и полипептидам, лактирующим животным.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не рекомендуется одновременное применение с препаратами из групп пенициллинов, цефалоспоринов, линкозамидов.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо крупного рогатого скота – 14 суток. Мясо свиней – 8 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

ФЛОРИНОЛ

Florinolum



Антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 300 мг флорфеникола.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50, 100, 200 мл и в полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Флорфеникол – синтетический антибиотик, производное тиамфеникола, в молекуле которого гидроксильная группа замещена атомом фтора. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus spp.*, *Proteus spp.*, *Enterobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Bordetella spp.*, а также в отношении *Mycoplasma spp.*

ПОКАЗАНИЯ

Флоринол применяют молодняку крупного рогатого скота и свиньям при колибактериозе, сальмонеллезе, стафилококкозе, стрептококкозе, желудочно-кишечных, респираторных и других заболеваниях, вызванных микроорганизмами чувствительными к флорфениколу.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Флоринол вводят подкожно двукратно с интервалом 48 часов в область шеи в дозах:

- *крупному рогатому скоту:* 1 мл на 15 кг массы тела животного;
- *свиньям:* 1 мл на 15-20 кг массы тела животного.

В одно место рекомендуется вводить не более 10 мл препарата.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата при тяжелых поражениях системы кроветворения, сердца, печени и почек, а также при индивидуальной повышенной чувствительности к флорфениколу.

Запрещается применение препарата стельным животным, быкам-производителям.

Запрещен к применению продуктивным животным, чье молоко используется в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не рекомендуется применение препарата с кортикостероидными препаратами, средствами, содержащими тиамфеникол и флорфеникол, антибиотиками групп пенициллинов и цефалоспоринов, фторхинолонами.

Запрещается смешивать препарат в одном шприце с другими лекарственными средствами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо крупного рогатого скота – 34 суток. Мясо свиней – 14 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

ФЛОРИТИЛ

Floritylum



Комплексный антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 200 мг флорфеникола, 25 мг ацетилизовалерилтилозина тартрата (тилвалозина тартрата), 5 мг преднизолона.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 20, 50, 100, 200 мл и в полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Флорфеникол – синтетический бактериостатический антибиотик, производное тиамфеникола, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: *Staphylococcus spp.*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Streptococcus spp.*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus spp.*, *Proteus spp.*, *Enterobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Bordetella spp.*, а также в отношении *Mycoplasma spp.*

Ацетилизовалерилтилозин относится к представителям нового поколения макролидных антибиотиков из группы тилозина. Препарат активен в отношении грамположительных микроорганизмов: *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus spp.*, *Clostridium perfringens*, *Brachyspira hyodysenteriae*, *Brachyspira pilosicoli*, некоторых грамотрицательных микроорганизмов: *Lawsonia intracellularis*, *Ornithobacterium rhinotracheale* и микоплазм: *Mycoplasma gallicepticum*, *M. synoviae*, *M. meleagrids*, *M. hyopneumoniae*, *M. hyosynoviae* и *M. hyorhinis*. Антибиотик также эффективен в отношении хламидий, риккетсий, пастерелл и некоторых других микроорганизмов.

Преднизолон является синтетическим глюкокортикостероидом короткого действия. Оказывает противовоспалительное, противоаллергическое и противострессовое действие.

ПОКАЗАНИЯ

Флоритил применяют молодняку крупного рогатого скота, свиньям, овцам при колибактериозе, сальмонеллезе, стафилококкозе, стрептококкозе; актинобациллярной плевропневмонии, гемофилезном полисерозите у свиней; респираторных, желудочно-кишечных и других заболеваниях, вызванных микроорганизмами чувствительными к компонентам препарата.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят подкожно или внутримышечно двукратно с интервалом 48 часов в дозах:

- *свиньям:* 1 мл на 15 кг массы тела животного;
- *крупному рогатому скоту:* 1 мл на 15-20 кг массы тела животного;
- *овцам:* 1 мл на 10-15 кг массы тела животного.

В одно место рекомендуется вводить не более 10 мл препарата.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата беременным животным, самцам-производителям.

Запрещается применение препарата продуктивным животным, чье молоко используется в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не рекомендуется применение препарата с кортикостероидными препаратами, средствами, содержащими тиамфеникол и флорфеникол, антибиотиками групп пенициллинов и цефалоспоринов, фторхинолонами.

Запрещается смешивать препарат в одном шприце с другими лекарственными средствами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо свиней – 20 суток. Мясо крупного рогатого скота – 46 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

ФТОРМАКС

Ftormaxum



Антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 100 мг энрофлоксацина.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 20, 50, 100, 200 мл и в полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Энрофлоксацин относится к группе фторхинолонов, обладает широким спектром антибактериального и антимикоплазменного действия, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в т.ч.: *Escherichia coli, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Campylobacter spp., Salmonella spp., Streptococcus spp., Haemophilus parasuis, Haemophilus somnus, Proteus spp., Clostridium spp., Bordetella spp., Corynebacterium spp., Staphylococcos spp.,* а также *Mycoplasma spp.*

ПОКАЗАНИЯ

Фтормакс применяют крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям и мелким домашним животным (собакам, кошкам) при инфекциях органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, септицемии, атрофическом рините, синдроме мастит-матрит-агалактии (ММА) и других болезнях, вызванных микроорганизмами? чувствительными к фторхинолонам, а также при смешанных и вторичных инфекциях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят в следующих дозах:

- *крупному и мелкому рогатому скоту:* 0,25-0,5 мл на 10 кг массы тела животного, внутримышечно, один раз в сутки в течение 3-5 дней или 0,75 мл на 10 кг массы тела животного, подкожно, однократно;
- *свиньям:* 0,25-0,5 мл на 10 кг массы тела животного внутримышечно, один раз в сутки в течение 3-5 дней или 0,75 мл на 10 кг массы тела животного, внутримышечно, однократно;
- *собакам и кошкам:* 0,025-0,05 мл на 1 кг массы тела животного, внутримышечно или подкожно, один раз в стуки в течение 3-5 дней.

В одно место крупному рогатому скоту вводят не более 10 мл, овцам – не более 5 мл, свиньям – не более 5 мл.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат противопоказан при нарушениях функции почек, печени, повышенной чувствительности к фторхинолонам.

Не назначают препарат беременным; щенкам мелких до 8-, средних до 12- и крупных пород до 18-месячного возраста.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Противопоказано совместное применение препарата с бактериостатическими антибиотиками (тетрациклинами, макролидами и амфениколами), теофиллином.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 14 дней. Молоко – 10 дней.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

ФОСФОТРИМ ПЛЮС

Fosfotrimum Plus



Комплексный антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 100 мг фосфомицина (в виде динатриевой соли) и 25 мг триметоприма.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50, 100, 200 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фосфомицин – антибиотик, обладает бактерицидным действием, относится к антибиотикам группы фосфоновой кислоты.

Триметоприм – синтетическое противомикробное средство широкого спектра действия из группы диаминопиримидинов, обладает бактериостатическим действием.

Компоненты препарата активны в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе: *Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Enterococcus faecalis, Citrobacter spp., Escherichia coli, Haemophilus spp., Klebsiella spp., Salmonella spp., Pasteurella spp., Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Actinomyces spp., Fusobacterium necrophorum, Chlamidia spp., Toxoplasma spp.* и *Coccidia spp.*, а также других микроорганизмов чувствительных к фосфомицину и триметоприму или их комбинации.

ПОКАЗАНИЯ

Фосфотрим Плюс применяют свиньям и крупному рогатому скоту при инфекционных заболеваниях органов дыхания (пастереллез, гемофиллез), желудочно-кишечного тракта (колибактериоз, сальмонеллез, анаэробная энтеротоксемия), мочеполовой системы (пиелонефрит, инфекции мочевыводящих путей), опорно-двигательного аппарата (некробактериоз, артриты бактериальной этиологии) и при других инфекционных заболеваниях, вызываемых микроорганизмами, чувствительными к фосфомицину и триметоприму.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят внутримышечно, один раз в сутки в течение 3-4 дней, в зависимости от тяжести заболевания:

- *свиньям:* в области шеи за ухом 1 мл на 10 кг массы тела животного;
- *крупному рогатому скоту:* в области средней трети шеи 1 мл на 10-15 кг массы тела животного.

Максимальный объем препарата для введения в одно место не должен превышать 10 мл для свиней и 20 мл для крупного рогатого скота.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается использовать препарат животным, имеющим повышенную чувствительность к компонентам препарата, а также животным в период беременности; при почечной и печеночной недостаточности.

Запрещается применять препарат продуктивным животным, чье молоко используется в пищу людям.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо крупного рогатого скота, свиней – 14 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

ЦЕФАПИК LA

Cefapigum LA



Антибактериальный препарат группы цефалоспоринов третьего поколения

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 100 мг цефтиофура (в форме кристаллической свободной цефтиофуровой кислоты).

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50, 100, 200 мл и полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цефтиофур – антибиотик цефалоспоринового ряда третьего поколения, обладающий широким спектром действия.

Активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая некоторые анаэробные бактерии и штаммы, продуцирующие β-лактамазу, и некоторых анаэробных бактерий: *Escherichia coli, Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Haemophilus somnus, Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, Salmonella spp., Streptococcus spp., Pasteurella spp., Staphylococcus spp., Actinomyces (Truepella) pyogenes, Klebsiela spp., Citrobacter spp., Enterobacter spp., Bacillus spp., Proteus spp., Fusobacterium necrophorum u Porphyromonas asaccharolytica, Porphlromonas levii.*

ПОКАЗАНИЯ

Цефапик LA применяют свиньям при респираторных инфекциях бактериальной этиологии, септицемии, полиартритах, сальмонеллезе, гемофилезном полисерозите, пастереллезе; крупному рогатому скоту при респираторных инфекциях бактериальной этиологии, некробактериозе, послеродовом метрите, а также при других болезнях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к цефтиофуру.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют однократно в следующих дозах:

- *свиньям:* 1 мл на 20 кг массы тела животного, внутримышечно;
- *крупному рогатому скоту:* 1 мл на 15 кг массы тела животного, подкожно.

Допускается применять препарат крупному рогатому скоту в дозе 1 мл на 100 кг массы тела животного, внутримышечно, в течение 3-5 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять препарат при индивидуальной чувствительности животных к компонентам препарата.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не рекомендуется применять препарат совместно с бактериостатическими антибактериальными лекарственными средствами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо свиней, крупного рогатого скота – 20 суток. Молоко – без ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

ЦЕФКИНОЛ 2,5%

Cefquinolum 2,5%



Антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 29,64 мг цефкинома сульфата (эквивалентно 25 мг цефкинома).

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50, 100, 200 мл и в полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цефкином относится к группе цефалоспоринов IV поколения, обладает широким спектром антибактериального действия.

Активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Escherichia coli, Klebsiella spp., Mannheimia haemolytica, Citrobacter spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium spp., Actinobacillus spp., Pasteurella multocida, Proteus spp., Salmonella spp., Serratia marcescens, Histophilus somni, Arcanobacterium pyogenes, Bacillus spp., Corynebacterium spp., Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Prevotella spp.* и *Erysipelothrix rhusiopathiae*, включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу.

ПОКАЗАНИЯ

Цефкинол 2,5% применяют крупному рогатому скоту при респираторных заболеваниях, межпальцевом дерматите бактериальной этиологии, некробактериозе и остром мастите, эшерихиозе (колибактериозе) телят; свиньям – при респираторных заболеваниях, синдроме ММА (мастит-метрит-агалактия), менингите, артрите, дерматите и других заболеваниях, вызванных чувствительными к цефкиному микроорганизмами.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят животным внутримышечно 1 раз в сутки в следующих дозах:

- *крупному рогатому скоту:*

– при респираторных заболеваниях: 2 мл на 50 кг массы тела животного, в течение 3-5 дней;

– при остром межпальцевом некробактериозе, дерматите бактериальной этиологии в области пальцев: 2 мл на 50 кг массы тела животного в течение 3-5 дней;

– при остром мастите, осложненном септицемией: 2 мл на 50 кг массы тела животного в течение 2 дней;

- *телятам*:

– при эшерихиозе (колибактериозе): 4 мл на 50 кг массы тела животного в течение 3-5 дней;

- *свиньям:*

– при респираторных заболеваниях: 2 мл на 25 кг массы тела животного в течение 3 дней;

– при синдроме ММА: 2 мл на 25 кг массы тела животного в течение 2 дней;

– при менингитах, артритах и дерматитах: 2 мл на 25 кг массы тела животного в течение 5 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещено применять препарат животным с повышенной индивидуальной чувствительностью к цефалоспоринам и β-лактамным антибиотикам.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не следует применять препарат одновременно с препаратами бактериостатического действия, в связи со снижением его бактерицидной активности.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо крупного рогатого скота – 8 суток. Мясо свиней – 4 суток. Молоко – 3 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 2 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

ЦЕФКИНОЛ 7,5%

Cefquinolum 7,5%



Антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 88,92 мг цефкинома сульфата (эквивалентно 75 мг цефкинома).

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50, 100, 200 мл и в полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цефкином относится к группе цефалоспоринов IV поколения, обладает широким спектром антибактериального действия.

Активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Escherichia coli, Klebsiella spp., Mannheimia haemolytica, Citrobacter spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium spp., Actinobacillus spp., Pasteurella multocida, Proteus spp., Salmonella spp., Serratia marcescens, Histophilus somni, Arcanobacterium pyogenes, Bacillus spp., Corynebacterium spp., Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Prevotella spp. и Erysipelothrix rhusiopathiae,* включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу.

ПОКАЗАНИЯ

Цефкинол 7,5% применяют крупному рогатому скоту при респираторных заболеваниях, пальцевом дерматите, инфекционном бульбарном некрозе, остром межпальцевом некробациллезе (нагноении ноги), остром мастите, сепсисе; свиньям при респираторных заболеваниях, синдроме ММА (мастит-метрит-агалактия), менингите, артрите, эпидермите и других заболеваниях, вызванных чувствительными к цефкиному микроорганизмами.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят животным в следующих дозах:

- *крупному рогатому скоту:* 1 мл на 30 кг массы тела животного, однократно, подкожно. В одно место следует вводить не более 10 мл препарата. Рекомендуется проводить лечение на начальных стадиях болезни и оценивать ответную реакцию животного в течение 48 часов после инъекции. Если клинические симптомы заболевания сохраняются, то следует ввести вторую инъекцию 1 мл препарата на 30 кг массы тела животного спустя 48 часов;
- *свиньям:* 1 мл на 25 кг массы тела животного, двукратно, внутримышечно с интервалом 48 часов. В одно место следует вводить не более 3 мл препарата.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещено применять препарат животным с повышенной индивидуальной чувствительностью к цефалоспоринам и β-лактамным антибиотикам.

Не применять препарат продуктивным животным, чье молоко используется в пищу людям.

Не применять в пределах 2 месяцев до первого отела у молодых телок, предназначенных для производства молока с целью его употребления в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не следует применять препарат одновременно с препаратами бактериостатического действия, в связи со снижением его бактерицидной активности.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо крупного рогатого скота – 13 суток. Мясо свиней – 7 суток. Молоко – 3 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 2 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

ЦЕФТОФУР 5%

Ceftofurum 5%





Антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 50 мг цефтиофура (в форме цефтиофура гидрохлорида).

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50, 100, 200 мл и в полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цефтиофур – антибиотик цефалоспоринового ряда третьего поколения, обладающий широким спектром действия.

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий: *Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Escherichia coli, Haemophilus somnus, Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, Salmonella spp., Streptococcus spp., Actynomyces pyogenes, Klebsiella spp., Citrobacter spp., Enterobacter spp., Bacillus spp., Proteus spp., Fusobacterium necrophorum* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Цефтофур 5% применяют крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям, мелким домашним животным (собакам и кошкам) при патологиях органов дыхания (бронхит, бронхопневмония, ринит), пищеварительного тракта (энтерит, гастроэнтерит, гастроэнтероколит), мочеполовой системы (эндометрит, синдром ММА, цистит, уретрит, пиелонефрит), суставов, кожи и мягких тканей, раневых, послеродовых и других первичных и вторичных инфекциях бактериальной этиологии, некробактериозе крупного рогатого скота, при других заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к цефтиофуру.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят 1 раз в сутки в следующих дозах:

- *крупному рогатому скоту:* 1 мл на 50 кг массы тела подкожно в течение 3-5 дней;
- *свиньям:* 1 мл на 16 кг массы тела внутримышечно в течение 3 дней;
- *собакам, кошкам:* 0,5 мл на 10 кг массы тела внутримышечно в течение 3-5 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не рекомендуется применять препарат животным с повышенной чувствительностью к бета-лактамным антибиотикам.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Запрещается совместное применение препарата с тетрациклинами, амфениколами, макролидами, линкозамидами, аминогликозидами, фуросемидом, этакридиновой кислотой.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота – 8 суток. Мясо свиней – 5 суток. Молоко – без ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

ЭНРАМОКС

Enramoxum



Комплексный антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 150 мг амоксициллина (в форме амоксициллина тригидрата) и 50 мг энрофлоксацина.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50, 100, 200 мл, в полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Амоксициллин – полусинтетический антибиотик из группы пенициллина.

Активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Staphylococcus spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Corynebacterium spp., Clostridium spp., Campylobacter spp., Brucella spp., Salmonella spp., Escherichia coli, Haemophilus spp., Bacteroides spp., Fusobacterium necrophorum, Proteus spp., Actinobacillus spp., Moraxella spp., Pasteurella spp.* и др.

Энрофлоксацин – антибиотик из группы фторхинолонов.

Активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp., Escherichia coli, Enterobacter spp., Campylobacter spp., Salmonella spp., Haemophilus spp., Proteus spp., Chlamydia spp., Staphylococcus spp., Mycoplasma spp., Mycobacterium spp.* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Энрамокс применяют при колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, синдроме мастит-метрит-агалактия (ММА), бактериальном энтерите, при респираторных и мочеполовых инфекциях у крупного и мелкого рогатого скота, свиней; при пневмонии, бронхопневмонии, трахеобронхите, инфекциях мочеполовой системы, бактериальном энтерите у собак и кошек, а также при других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к амоксициллину и энрофлоксацину.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах:

- *крупному рогатому скоту, свиньям:* 0,5 мл на 10 кг массы тела животного, внутримышечно, 1 раз в сутки в течение 3-5 дней или 1 мл на 15 кг массы тела животного, внутримышечно, 1 раз в 48 часов в течение 4-5 дней;
- *свиноматкам:* 1 мл на 20 кг массы тела животного, внутримышечно, 1 раз в сутки в течение 1-2 дня;
- *собакам, кошкам:* 0,5-1,0 мл на 10 кг массы тела животного, внутримышечно, 1 раз в сутки в течение 3-5 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять препарат животным, имеющим индивидуальную чувствительность к пенициллинам, цефалоспоринам, фторхинолонам; при нарушении выделительной функции почек.

Запрещается применять препарат беременным животным, при нарушениях развития хрящевой ткани, поражениях нервной системы, сопровождающихся судорогами и животным.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Запрещается совместное применение препарата с антибиотиками групп тетрациклина, макролидами, линкозамидами, сульфаниламидами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 21 сутки. Молоко – 4 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранятпри температуре от + 15 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

После вскрытия флакона препарат необходимо использовать в течение 21 дня.

МАСТИКУР LC

Masticurum LC



Комплексный антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В шприце-дозаторе содержится клоксациллина натриевая соль – 250 мг, фосфомицин (в форме динатриевой соли) – 150 мг, дексаметазона натрия фосфат – 0,5 мг.

Препарат выпускают расфасованным по 8,15 г в пластиковые шприцы-дозаторы для интрацистернального введения, укупоренные пластиковыми колпачками.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Клоксациллин – антибиотик из группы пенициллинов.

Активен в отношении грамположительных микроорганизмов, в том числе *Streptococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus spp.* (в том числе и штаммов, резистентных к пенициллину) и *Corynebacterium pyogenes.*

Фосфомицин – антибиотик, производное фосфоновой кислоты.

Активен в отношении большинства грамположительных микроорганизмов: *Enterococcus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp.* и грамотрицательных микроорганизмов: *Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp.*

Дексаметазон является синтетическим глюкокортикостероидом, метилированным производным фторпреднизолона, оказывает противовоспалительное, противоаллергическое и противоотечное действия.

ПОКАЗАНИЯ

Мастикур LC применяют для лечения коров, овец и коз, больных маститами в период лактации.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят трёхкратно интрацистернально с интервалом в 12 часов, коровам в разовой дозе 8,15 г (1 шприц-дозатор), овцам и козам – 4,075 г (половину содержимого шприца-дозатора) в каждую пораженную четверть вымени.

Перед применением препарата поражённую четверть вымени полностью освобождают от секрета, дезинфицируют сосок очищающей салфеткой. С наконечника шприца снимают колпачок и вводят наконечник в молочный канал вымени. Содержимое шприца выдавливают в пораженную четверть, после чего удаляют шприц, пережимают верхушку соска и массируют четверть.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещено применять препарат животным с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Препарат не следует назначать одновременно с другими антибактериальными препаратами для интрацистернального введения, а также с анальгетиками и антикоагулянтами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо крупного и мелкого рогатого скота – 28 суток. Молоко – 11 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

УЛЬТРАМАСТ

Ultramastum



Комплексный антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В шприце-дозаторе содержится 100 мг бензилпенициллина прокаина, 100 мг стрептомицина сульфата, 100 мг неомицина сульфата, 10 мг преднизолона.

Препарат выпускают расфасованным по 5 г в пластиковые шприцы-дозаторы для интрацистернального введения, укупоренные пластиковыми колпачками.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Комбинация антибиотиков: пенициллина прокаина, стрептомицина сульфата, неомицина сульфата, обладает широким спектром противомикробного действия в отношении наиболее часто выделяемых при мастите микроорганизмов: *Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Corynebacterium pyogenes, Escherichia coli*, включая штаммы, устойчивые к пенициллину, тетрациклину, левомицетину и другим антибиотикам.

Преднизолон – синтетический глюкокортикостероид, оказывая противовоспалительное действие, снижает воспаление и уменьшает отек тканей вымени.

ПОКАЗАНИЯ

Ультрамаст назначают для лечения мастита бактериальной этиологии у коров в период лактации.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят интрацистернально в пораженные четверти вымени в дозе 5 г (содержимое 1 шприца в каждую пораженную четверть) трехкратно с интервалом 24 часа.

Перед применением препарата молоко (секрет) из больных четвертей вымени выдаивают и утилизируют, сосок обрабатывают дезинфицирующим раствором, затем в канал соска вводят канюлю шприца-дозатора и осторожно выдавливают содержимое. После этого канюлю извлекают, верхушку соска пережимают пальцами на 1-2 минуты и слегка массируют сосок снизу вверх для лучшего распределения препарата.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещено применять препарат животным с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Применение препарата не исключает использование других лекарственных средств для животных, за исключением препаратов для интрацистернального введения.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо крупного рогатого скота – 14 суток. Молоко – 96 часов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

ЦЕФКИНОМ DC

Cefquinomum DC



Антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В шприце-дозаторе содержится 150 мг цефкинома (в форме цефкинома сульфата).

Препарат выпускают расфасованным по 3 г в стерильные пластиковые шприцы-дозаторы для интрацистернального введения.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цефкином относится к группе цефалоспоринов IV поколения, обладает широким спектром антибактериального действия.

Активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Escherichia coli, Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp.* (в том числе *Streptococcus dysagalactiae, Streptococcus agalactiae, Streptococcus uberis*), *Proteus spp., Bacteroides spp.*, коагулазонегативные стафилококки (*Staphylococcus xylosis, Staphylococcus warneri, Staphylococcus simulans* и др.) и др.

ПОКАЗАНИЯ

Цефкином DC предназначен для лечения коров, больных субклиническим маститом в сухостойный период, вызванным микроорганизмами, чувствительными к цефалоспоринам.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят интрацистернально в пораженные четверти вымени, однократно, после последнего доения перед переводом в сухостойный период, но не позднее, чем за 36 суток до предполагаемого отела, в дозе 1 шприц-дозатор (3 г) на одну четверть вымени.

Перед применением препарата поражённую четверть вымени полностью освобождают от молока, дезинфицируют сосок очищающей салфеткой. С наконечника шприца снимают колпачок и вводят наконечник в молочный канал вымени. Содержимое шприца полностью выдавливают в пораженную четверть, после чего удаляют шприц, пережимают верхушку соска и массируют четверть.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат запрещается использовать в период лактации и менее чем за 36 дней до отела.

Запрещено применять препарат животным с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Применение препарата не исключает использование других лекарственных средств для животных, за исключением препаратов для интрацистернального введения.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо крупного рогатого скота – 4 суток. Молоко – без ограничения (при условии применения препарата более чем за 36 дней до отела).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

ЦЕФКИНОМ LC

Cefquinomum LC

Антибактериальный препарат широкого спектра действия



СОСТАВ

В шприце-дозаторе содержится 88,92 мг цефкинома сульфата (эквивалентно 75 мг цефкинома).

Препарат выпускают расфасованным по 8 г в стерильные пластиковые шприцы-дозаторы для интрацистернального введения.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цефкином относится к группе цефалоспоринов IV поколения, обладает широким спектром антибактериального действия.

Активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Escherichia coli, Streptococcus spp., Proteus spp., Bacteroides spp., Fusobacterium necrophorum, Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Цефкином LC предназначен для лечения субклинических и клинических маститов коров в период лактации.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят трёхкратно интрацистернально с интервалом в 12 часов, после доения по 1 шприцу в каждую пораженную четверть вымени.

Перед применением препарата поражённую четверть вымени полностью освобождают от молока, дезинфицируют сосок очищающей салфеткой. С наконечника шприца снимают колпачок и вводят наконечник в молочный канал вымени. Содержимое шприца полностью выдавливают в пораженную четверть, после чего удаляют шприц, пережимают верхушку соска и массируют четверть.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещено применять препарат животным с повышенной индивидуальной чувствительностью к цефалоспоринам и β-лактамным антибиотикам.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не рекомендуется применять препарат с другими антибактериальными средствами, обладающими бактериостатическим действием.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо крупного рогатого скота – 4 суток. Молоко – 84 часа.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

ВНУТРИМАТОЧНЫЕ РАСТВОРЫ

Эндовазол 85
Эндолекс 86
Эндовит 87
Эндоген 88
Эндотрим 89
Эндойодол 90

ПРОМВЕТСЕРВИС

ЭНДОВАЗОЛ

Endovasolum



Антибактериальный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 5 мг ацетилизовалерилтилозина тартрата и 0,04 мг β-каротина.

Препарат выпускают в полимерной упаковке по 100, 500, 1000 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Ацетилизовалерилтилозина тартрат относится к представителям нового поколения макролидных антибиотиков из группы тилозина. Препарат оказывает бактерицидное действие на большинство грамположительных и некоторые грамотрицательные бактерии (стафилококков, стрептококков, коринебактерий, клостридий, пастерелл, фузобактерии), микоплазм, хламидий, риккетсий.

β-каротин является предшественником витамина А, способствует регенерации слизистой оболочки матки.

ПОКАЗАНИЯ

Эндовазол применяют для лечения коров, больных послеродовыми эндометритами, вызванными микрофлорой, чувствительной к макролидам.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Эндовазол вводят внутриматочно в дозе 20 мл на 100 кг массы тела животного с интервалом 48 ч до клинического выздоровления. Перед применением препарат подогревают до температуры 35-40°С и тщательно перемешивают.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат противопоказан при аллергии в анамнезе на антибиотики группы макролидов (тилозин, эритромицин, олеандомицин, азитримицин, спирамицин).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Применение препарата не исключает использования других лекарственных средств специфической, патогенетической и симптоматической терапии.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 3 суток. Молоко – 24 ч.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

ЭНДОЛЕКС

Endolexum

Антибактериальный препарат широкого спектра действия



СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 3,5 мг левофлоксацина.

Эндолекс выпускают в полимерной упаковке по 100, 500, 1000 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Левофлоксацин относится к группе фторхинолонов.

Препарат активен в отношении: *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Enterobacter spp.*, *Campylobacter spp.*, *Salmonella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Proteus spp.*, *Chlamydia spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Mycoplasma spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Pasteurella spp.*, *Mycobacterium spp.* и др.

ПОКАЗАНИЯ

Эндолекс применяют для лечения коров, больных послеродовыми эндометритами, вызванными микрофлорой чувствительной к фторхинолонам.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Эндолекс вводят внутриматочно в дозе 20 мл. на 100 кг массы тела животного с интервалом 48 ч до клинического выздоровления. Перед применением препарат подогревают до температуры 35-40 °С и тщательно перемешивают.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат противопоказан при аллергии к производным хиноксалина (диоксидин), хинолона (кислота оксолиновая), фторхинолона (энрофлоксацин, ципрофлоксацин и др.).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Применение препарата не исключает использования других лекарственных средств специфической, патогенетической и симптоматической терапии.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 7 суток. Молоко – 2 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

ЭНДОВИТ

Endovitum



Противоэндометритный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 4 мг метилурацила и 15 мг пропранолола гидрохлорида.

Препарат выпускают и полимерной упаковке по 100, 500, 1000 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Пропранолол гидрохлорид усиливает сократительную способность миометрия матки, что способствует более быстрому отделению последа и удалению содержимого из матки, а также уменьшает кровотечение при родах и в послеродовом периоде.

Метилурацил антиоксидантное, иммуностимулирующее, антитоксическое и антистрессовое средство.

ПОКАЗАНИЯ

Эндовит применяют в комплексной терапии для лечения коров и свиноматок, больных послеродовыми эндометритами, и для профилактики послеродовых акушерских заболеваний.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед введением препарата проводят санитарную обработку наружных половых органов. При необходимости освобождают полость матки от воспалительного экссудата.

- *Коровам:* внутриматочно в дозе 20 мл на 100 кг массы тела животного с интервалом 24-48 ч до клинического выздоровления. Перед применением препарат подогревают до температуры 35-40 °С и тщательно перемешивают.

При лечении хронического и субклинического эндометритов до введения лекарственного препарата необходимо провести ректальный массаж матки в течение 1,5-2,0 минут.

Для профилактики послеродовых акушерских болезней препарат вводят однократно внутриматочно в дозе 50-150 мл после отделения последа, абортов или оказания помощи при осложненных и патологических родах.

- *Свиноматкам:* вводят внутриматочно в дозе 20 мл на 100 кг массы тела животного с интервалом 24-48 ч до клинического выздоровления, но не более 50 мл. Перед применением препарат подогревают до температуры 35-40 °С и тщательно перемешивают.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Применение препарата не исключает использования других лекарственных средств специфической, патогенетической и симптоматической терапии.

Не допускается одновременное применение с препаратами на основе ксилазина (ксила, ксиланит, рометар, ромпун и др.).

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 2 суток. Молоко – без ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

ЭНДОГЕН

Endogenum



Комплексный противомикробный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 2 мг ципрофлоксацина, 3 мг гентамицина, 4 мг метилурацила, 15 мг пропранолола гидрохлорида.

Препарат выпускают в полимерной упаковке по 100, 500, 1000 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Ципрофлоксацин относится к группе фторхинолонов и обладает широким спектром противомикробного действия.

Гентамицин – антибиотик из группы аминогликозидов широкого спектра противомикробного действия, активен в отношении большинства грамотрицательных микроорганизмов: *Escherichia coli*, *Enterobacter spp.*, *Salmonella spp.*, *Campylobacter spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus spp.* и др. и грамположительных микроорганизмов: *Corynebacterium spp.*, *Staphylococcus aureus*, *Bacillus anthracis*, *Lysteria monocytogenes*. Антибиотик не действует на анаэробные бактерии, грибы, вирусы и на простейших.

Метилурацил – антиоксидантное, иммуностимулирующее, антитоксическое и антистрессовое средство. Ускоряет процессы клеточной регенерации (восстановления); ускоряет заживление поврежденных участков слизистой оболочки, стимулирует клеточные и гуморальные (тканевые) факторы зашиты. Оказывает также противовоспалительное действие.

Пропранолола гидрохлорид усиливает сократительную способность миометрия матки, уменьшает кровотечение при родах и в послеоперационном периоде.

ПОКАЗАНИЯ

Эндоген применяют у коров и свиноматок при послеродовых осложнениях (нарушение субинволюции матки, эндометрит, метрит) и других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к компонентам препарата.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед введением препарата проводят санитарную обработку наружных половых органов. При необходимости освобождают полость матки от воспалительного экссудата.

- *Коровам:* внутриматочно в дозе 20 мл на 100 кг массы тела животного с интервалом 24-48 ч до клинического выздоровления. Перед применением препарат подогревают до температуры 35-40 °С и тщательно перемешивают.

При лечении хронического и субклинического эндометритов до введения лекарственного препарата необходимо провести ректальный массаж матки в течение 1,5-2,0 минут.

При послеродовых акушерских болезнях (эндометрит, метрит, субинволюция матки), а также при абортах или оказании помощи при осложненных и патологических родах препарат вводят однократно внутриматочно в дозе 50-150 мл.

- *Свиноматкам:* препарат вводят внутриматочно в дозе 20 мл на 100 кг массы тела животного с интервалом 24-48 ч до клинического выздоровления, но не более 50 мл. Перед применением препарат подогревают до температуры 35-40 °С и тщательно перемешивают.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не допускается одновременное применение с препаратами на основе ксилазина (ксила, ксиланит, рометар, ромпун и др.).

Применение препарата не исключает использования других лекарственных средств специфической, патогенетической и симптоматической терапии.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 3 суток. Молоко – 72 часа.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

ЭНДОТРИМ

Endotrimum



Комплексный противомикробный препарат для лечения и профилактики послеродовых заболеваний

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 40 000 МЕ колистина сульфата, 4 мг энрофлоксацина, 2 мг триметоприма, 15 мг пропраналола.

Препарат выпускают в полимерной упаковке по 100, 500, 1000 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Энрофлоксацин, входящий в состав препарата, относится к группе фторхинолонов и обладает широким спектром противомикробного действия.

Колистина сульфат – смесь сульфатных полипептидов, продуцируемых некоторыми штаммами *Bacillus polymyxia*.

Триметоприм – химиотерапевтический препарат.

Пропранолол - неселективный бета-адреноблокатор.

Эндотрим – противоэндометритный препарат. Входящие в состав препарата компоненты активны в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе эшерихий, сальмонелл, пастерелл, коринебактерий, клебсиелл, стрептококков, стафилококков, некоторых штаммов протея, микоплазм.

ПОКАЗАНИЯ

Эндотрим применяют для лечения коров и свиноматок, больных послеродовым эндометритом и для профилактики послеродовых акушерских заболеваний.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед введением препарата проводят санитарную обработку наружных половых органов. При необходимости освобождают полость матки от воспалительного экссудата

- *Коровам:* внутриматочно в дозе 20 мл на 100 кг массы тела животного с интервалом 24-48 ч до клинического выздоровления. Перед применением препарат подогревают до температуры 35-40 °С и тщательно взбалтывают.

При лечении хронического и субклинического эндометритов до введения лекарственного препарата необходимо провести ректальный массаж матки в течение 1,5-2,0 минут.

- *Свиноматкам:* вводят внутриматочно в дозе 20 мл на 100 кг массы тела животного с интервалом 24-48 ч до клинического выздоровления, но не более 50 мл. Перед применением препарат подогревают до температуры 35-40 °С и тщательно взбалтывают.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Применение препарата не исключает использования других лекарственных средств специфической, патогенетической и симптоматической терапии. Не допускается одновременное применение с препаратами на основе ксилазина (ксила, ксиланит, рометар, ромпун и др.).

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 3 суток. Молоко – 24 часа.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

ЭНДОЙОДОЛ

Endoiodolum

Противомикробный препарат широкого спектра действия



СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 100 мг повидон-йода (что соответствует 10 мг йода).

Препарат выпускают в полимерных флаконах по 100, 500, 1000 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Повидон-йод обладает широким спектром противомикробного действия.

Высокоактивен в отношении грамположительных бактерий: *Streptococcus spp*. (в том числе *Str. mutans*, *Str. sangius*), *Staphylococcus spp*. (в том числе *Staphylococcus aureus*), *Bacillus subtillis*., *Clostridium spp*; грамотрицательных бактерий: *Escherichia spp*., *Proteus spp*., *Pseudomonas spp*., некоторых грибков и простейших.

ПОКАЗАНИЯ

Эндойодол применяют для лечения коров и свиноматок при эндометритах, при воспалениях шейки матки (цервицитах), воспалениях влагалища (вагинитах) и преддверии влагалища (вестибулитах), задержании последа, при трихомонозе крупного рогатого скота и профилактики воспалительных процессов, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят внутриматочно при помощи катетера в количестве в зависимости от объема матки. Перед применением тщательно встряхнуть.

Крупному рогатому скоту:

- при эндометрите, трихомониазе: с лечебной целью вводят до 150 мл (в зависимости от объема матки) с интервалом 24-48 часов в комплексе с другими антимикробными средствами, до клинического выздоровления;
- при скрытом эндометрите: вводят 20 мл препарата через 12-24 часа после осеменения, однократно;
- при цервицитах, вагинитах и вестибулитах: препарат применяют методом орошения либо введением тампонов во влагалище, смоченных в растворе препарата (после обработки тампоны удаляют) с интервалом 10-12 часов, до клинического выздоровления;
- при задержке последа: вводят 150 мл препарата, однократно. После введения препарата происходит сокращение матки.

Свиньям:

- при эндометрите: с лечебной целью вводят 150 мл (в зависимости от объема матки). Введение препарата должно быть сделано до истечения 12 часов после опороса. Препарат вводят с интервалом 24-48 часов в комплексе с другими антимикробными средствами, до клинического выздоровления.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат противопоказан к применению при повышенной чувствительности к йоду.

Запрещено применять при гипертиреозе и других нарушениях щитовидной железы, при беременности.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо и молоко крупного рогатого скота, мясо свиней – без ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ОРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ
Аспирон 92

ИНЪЕКЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ
Контрапаин-10 93
Кетопрофен Лонг 94
Мелоксидин 95
Пиралгон 96

ОРАЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ
Парацетамол 30% 97

ОРАЛЬНЫЕ СУСПЕНЗИИ
Неболин-вет 98

ПРОМВЕТСЕРВИС

АСПИРОН

Aspironum



Противовоспалительный препарат с жаропонижающим и анальгезирующим действием

СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 700 мг ацетилсалициловой кислоты.

Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 200, 500, 1000 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Ацетилсалициловая кислота ингибирует циклооксигеназу (простагландинсинтетазу), что приводит к уменьшению синтеза простагландинов и тромбоксанов.

ПОКАЗАНИЯ

Аспирон применяют крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям при патологических состояниях, сопровождающихся воспалительными и болевыми симптомами, включая респираторные и желудочно-кишечные заболевания; синдроме мастит-метрит-агалактия (ММА) у свиней, ревматоидном артрите, остеоартрите, мышечных и послеоперационных болях, тепловом стрессе у животных; птице при тепловых стрессах, вызванных высокими температурами и при инфекционных заболеваниях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют с питьевой водой или кормом в течение 3-5 дней в следующих дозах:

- *свиньям:* 0,5-1,0 г препарата на 7 кг массы тела животного (50-100 мг/кг по ДВ);
- *крупному рогатому скоту:* 1,0 г препарата на 7 кг массы тела животного (100 мг/кг по ДВ);
- *мелкому рогатому скоту:* 1,0 г препарата на 7 кг массы тела животного (100 мг/кг по ДВ).
- *Птице (при групповой даче)* препарат применяют в дозе 300-600 г на 1000 л питьевой воды в течение 3-5 дней. Допускается увеличение дозы препарата до 1200 г на 1000 л питьевой воды на период не более 4-6 часов при высоких температурных режимах в птичниках, при тепловых стрессах, при высокой плотности посадки и тяжелых клинических состояниях птицы и др.
- *Птице (при индивидуальной даче)* доза 0,07 г препарата (50 мг/кг по ДВ) на 1 кг массы тела птицы в течение 3-5 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Аспирон не рекомендуют применять животным с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с нарушением процесса свертываемости крови.

Противопоказано применять поросятам до 30-ти дневного возраста; при обезвоживании организма.

С осторожностью применять препарат беременным и кормящим животным.

Запрещается применение препарата всем видам животных, молоко которых используется в пищу людям.

Препарат запрещен к применению птице, чьё яйцо используется в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не рекомендуется применять препарат совместно с другими противовоспалительными нестероидными лекарственными средствами, а также с глюкокортикостероидами и аминогликозидными антибиотиками, фторхинолонами, при использовании антикоагулянтов.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 1 сутки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от 0 °С до +30 °С, в защищенном от света и влаги месте.

КОНТРАПАИН-10

Kontrapainum-10

Противовоспалительный препарат



СОСТАВ

В 1 мл препарата содержится 10,0 мг нефопама (в форме нефопама гидрохлорида).

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 10 и 20 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Нефопам – неопиоидное, ненаркотическое анальгезирующее средство центрального действия.

Нефопам проявляет антиноцицептивную активность, путем снижения высвобождения глутамата на пресинаптическом уровне и активацию рецепторов N-метил-D-аспартата на постсинаптическом уровне.

Нефопам не оказывает противовоспалительного или жаропонижающего действия, не угнетает дыхание.

Нефопам обладает незначительным антихолинергическим эффектом.

ПОКАЗАНИЯ

Контрапаин-10 применяют собакам для симптоматического лечения острого болевого синдрома, в том числе послеоперационных болей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют внутримышечно в дозе 1-2 мг нефопама на 1 кг массы тела животного или внутривенно (медленно) в дозе 0,2-0,5 мг нефопама на 1 кг массы тела животного (рекомендуемая доза на одно введение). Дозу устанавливают индивидуально в зависимости от интенсивности болевого синдрома и реакции животного. При необходимости введение повторяют каждые 4 часа.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применять препарат беременным и лактирующим самкам, щенкам моложе 6-месячного возраста, животным в состоянии дегидратации, гиповолемии и гипотензии, ввиду возможного токсического влияния препарата на почки и печень.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

КЕТОПРОФЕН ЛОНГ

Ketoprofenum long



Противовоспалительный препарат

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержатся 100 мг кетопрофена.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 20, 50, 100, 200 мл и в полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Кетопрофен является производным пропионовой кислоты, обладает выраженным противовоспалительным, анальгезирующим и жаропонижающим действием, подавляет агрегацию тромбоцитов, стабилизирует лизосомальные мембраны, вызывает угнетение активности нейтрофилов у больных артритом животных.

ПОКАЗАНИЯ

Кетопрофен Лонг назначают крупному рогатому скоту, свиньям и спортивным лошадям в качестве противовоспалительного, анальгезирующего и жаропонижающего средства при лечении острых и хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, вывихи, отеки, тендовагиниты, травмы), болевого синдрома различной этиологии (травматическая и послеоперационная боль, колики) и гипертермии различной этиологии.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют животным в следующих дозах:

- *крупному рогатому скоту:* 3 мл на 100 кг массы животного внутривенно или внутримышечно, один раз в сутки, в течение 1-3 дней;
- *спортивным лошадям (при лечении опорно-двигательного аппарата):* 1 мл на 45 кг массы животного внутривенно, один раз в сутки, в течение 3-5 дней;
- *спортивным лошадям (при симптоматическом лечении колик):* 1 мл на 45 кг массы животного внутривенно, однократно;
- *свиньям:* 3 мл на 100 кг массы животного внутримышечно, один раз в сутки, в течение 1-3 дней.

Продолжительность курса лечения зависит от состояния животного и определяется лечащим врачом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещено применять препарат животным при индивидуальной повышенной чувствительности к компонентам препарата, язве желудка и 12-перстной кишки, геморрагическом синдроме, выраженной почечной недостаточности.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не применять препарат одновременно с другими нестероидными противовоспалительными средствами, глюкокортикоидами, диуретиками и антикоагулянтами и смешивать в одном шприце с другими лекарственными средствами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо крупного рогатого скота –5 дней. Мясо свиней – 4 дня.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

МЕЛОКСИДИН

Meloxidinum



Противовоспалительный препарат с жаропонижающим и анальгезирующим действием

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 20 мг мелоксикама.

Мелоксидин выпускают в стеклянных флаконах по 50, 100, 200 мл, полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Мелоксикам относится к нестероидным противовоспалительным средствам класса оксикамов. Препарат избирательно ингибирует фермент циклооксигеназу-II (ЦОГ-II), подавляет синтез простагландинов (медиаторов воспаления), обеспечивая противовоспалительный и жаропонижающий эффект, незначительно влияет на циклооксигеназу-I (ЦОГ-I).

ПОКАЗАНИЯ

Мелоксидин применяют сельскохозяйственным животным (крупному и мелкому рогатому скоту, лошадям, свиньям) в качестве противовоспалительного, обезболивающего и жаропонижающего средства в комплексной терапии при акушерско-гинекологических (мастит, эндометрит, синдром мастит-метрит-агалактия), респираторных патологиях (пневмонии, бронхиты и др.), а также при острых и хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сопровождающихся болью и воспалением (переломы, травматические артропатии, растяжение связок и сухожилий, остеоартриты, хронические дегенеративные поражения суставов и др.) и для устранения болевого синдрома различной этиологии у животных.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Мелоксидин назначают однократно, в следующих дозах:

- *крупному и мелкому рогатому скоту:* 2,5 мл на 100 кг массы тела животного подкожно или внутримышечно;
- *лошадям:* 3,0 мл на 100 кг массы тела животного внутримышечно;
- *свиньям:* 0,2 мл на 10 кг массы тела животного, внутримышечно у основания уха.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата телятам в возрасте ранее двух недель, жеребятам в возрасте ранее шести недель, жеребым или лактирующим кобылам, животным с нарушениями функции почек и печени.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Запрещается одновременное применение препарата с глюкокортикостероидами, другими нестероидными противовоспалительными препаратами, антикоагулянтами, при повышенной чувствительности к препарату.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо крупного рогатого скота – 15 дней. Мясо свиней и лошадей – 5 дней. Молоко – 5 дней.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

ПИРАЛГОН

Pyralgonum



Противовоспалительный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 82,5 мг флуниксина меглумина.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50, 100, 200 мл и в полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Флуниксина меглумин – нестероидное противовоспалительное средство.

Препарат является неселективным ингибитором циклооксигеназ (ЦОГ1 и ЦОГ2), угнетает синтез простагландинов Е2 – медиаторов воспаления.

ПОКАЗАНИЯ

Пиралгон применяют в качестве противовоспалительного, болеутоляющего и жаропонижающего средства крупному рогатому скоту при воспалительных процессах, маститах, диарее, артритах, заболеваниях конечностей; свиньям при синдроме мастит-метрит-агалактия (ММА), эндометритах, артритах, диарее (совместно с соответствующими средствами противомикробной терапии); лошадям для купирования воспаления и снятия болевого синдрома при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, коликах и др.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Пиралгон вводят в следующих дозах:

- *крупному рогатому скоту:* 2 мл на 45 кг массы внутримышечно или внутривенно один раз в день в течение 2-5 дней;
- *лошадям:* 1 мл на 45 кг массы тела внутривенно один раз в день, не более 5 дней;
- *свиньям:* 1 мл на 20 кг массы внутримышечно в область шеи один раз в день в течение 2-5 дней. В одно место рекомендуется вводить не более 5 мл препарата.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не рекомендуется применять препарат беременным животным, хрякам, быкам-производителям, животным до 6-недельного возраста, поросятам массой менее 6 кг.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Запрещается смешивать препарат в одном шприце с другими лекарственными средствами.

Запрещается совместное применение препарата с другими нестероидными противовоспалительными средствами, кортикостероидными препаратами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо крупного рогатого скота, свиней и лошадей – 21 сутки. Молоко – 5 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

ПАРАЦЕТАМОЛ 30%

Paracetamolum 30%



Противовоспалительный препарат с высокой биоактивностью

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 300 мг парацетамола.

Препарат выпускают по 100, 250, 500, 1000 мл. в полимерных флаконах.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Парацетамол (ацетаминофен), входящий в состав препарата, относится к группе производных аминофенолов и обладает анальгетическим, жаропонижающим и слабым противовоспалительным действием.

ПОКАЗАНИЯ

Парацетамол 30% применяют свиньям, телятам, ягнятам и сельскохозяйственной птице как симптоматическое лечебное средство при патологических процессах, сопровождающихся повышением температуры тела, развитием болевых синдромов различной этиологии, после вакцинации, абортов и при других заболеваниях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Парацетамол 30% применяют орально в следующих дозах:

- *свиньям, телятам и ягнятам:* 0,1 мл на 1 кг массы тела животного или 1 л на 1000 л воды в течение 5 дней;
- *птице (цыплята-бройлеры, ремонтный молодняк родительское стадо, куры-несушки):* групповым способом с водой для поения в суточной дозе 0,5 мл на 1 л воды в течение 5 дней. При тяжелых случаях заболеваний, рецидивах и других стрессовых ситуациях, допускается применение препарата из расчета 0.5-1 мл на 1 л воды.

В течение всего периода лечения животные и птица должны получать только воду, содержащую препарат.

Для всех видов животных и птицы лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление в течение суток.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат противопоказан животным с выраженной печеночной и/или почечной недостаточностью.

Применяют с осторожностью беременным и животным в период лактации.

Препарат запрещен к применению птице, чьё яйцо используется в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не рекомендуется применять одновременно с рифампицином, барбитуратами, так как это может привести к усилению гепатотоксического эффекта и снижению жаропонижающего действия самого препарата. Не применять совместно с другими лекарственными препаратами, содержащими парацетамол.

Необходимо учитывать, что парацетамол усиливает действие салициловой кислоты, кофеина и спазмолитиков.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо свиней – 24 часа.

Мясо молодняка крупного и мелкого рогатого скота, птицы – 1 сутки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

НЕБОЛИН-ВЕТ

Nebolin-vetum



Противовоспалительный препарат с жаропонижающим и анальгезирующим действием

СОСТАВ

В 1 мл препарата содержится 1 мг мелоксикама.

Препарат выпускают в полимерных флаконах по 5, 10 и 20 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Мелоксикам – нестероидное противовоспалительное средство класса оксикамов.

Мелоксикам обладает выраженной противовоспалительной, анальгетической и жаропонижающей активностью.

ПОКАЗАНИЯ

Неболин-вет применяют собакам и кошкам для профилактики болевого синдрома, в том числе послеоперационных болей, а также лечения воспалений при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, вывихи, отеки, синовиты, тендовагиниты и др.).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют орально, 1 раз в сутки в течение 7-14 дней в следующих дозах:

- *собакам (после кормления):* в первый день 0,2 мл препарата на 1 кг массы тела животного; в последующие дни – 0,1 мл препарата на 1 кг массы тела животного;
- *кошкам:* в первый день 0,1 мл препарата на 1 кг массы тела животного; в последующие дни – 0,05 мл препарата на 1 кг массы тела животного.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применять препарат беременным и лактирующим самкам, щенкам и котятам моложе 6-недельного возраста, животным в состоянии дегидратации, гиповолемии и гипотензии, ввиду возможного токсического влияния препарата на почки.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не применять совместно с другими нестероидными противовоспалительными средствами, глюкокортикостероидами, диуретиками, антикоагулянтами и другими препаратами, для которых характерна высокая степень связывания с сывороточными белками из-за вероятности усиления токсического действия препарата, а также не ранее 24 часов после отмены предыдущего нестероидного противовоспалительного средства.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от 0 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

АНТИПРОТОЗОЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, КОКЦИДИОСТАТИКИ

ОРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ

Эймосан 100

ОРАЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ

Галофур 101
Прококс 102
Толутрокс 2,5% 103
Толутрокс 5% 104

ПРОМВЕТСЕРВИС

ЭЙМОСАН

Eimosanum

Комплексный противоэймериозный препарат



СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 80 мг никарбазина и 80 мг монензина.

Препарат выпускают в многослойных мешках из композитных материалов с полиэтиленовой вставкой внутри по 1 кг и 25 кг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Эймосан – комплексный противоэймериозный препарат, состоящий из монензина (полиэфирный ионофорный антибиотик) и никарбазина (синтетическое противоэймериозное средство). Препарат активен в отношении всех видов эймерий, паразитирующих у птиц, в том числе *Eimeria tenella*, *E. necatrix*, *E. mivati*, *E. maxima*, *E. brunetti*, *E. acervulina* и др.

Никарбазин прерывает жизненный цикл эймерий преимущественно на стадии шизонтов второго поколения.

Монензин действует на эймерии в основном на первой фазе развития (шизогонии).

ПОКАЗАНИЯ

Эймосан применяют для лечения эймериоза у цыплят-бройлеров, ремонтного молодняка кур до 16-недельного возраста.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Эймосан птице задают в дозе из расчета 500-625 г на 1 тонну корма, исключая препарат из рациона за 5 дней до убоя.

Для равномерного распределения препарата применяют дробное смешивание: суточную дозу эймосана смешивают с небольшим количеством комбикорма (1:9), а затем, при тщательном перемешивании, вносят в корм, рассчитанный на потребление птицей в течение суток.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять препарат племенной птице и птице, чье яйцо используется в пищу людям.

ПРИМЕНЕНИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Препарат совместим с витаминами и основными кормовыми добавками, применяемыми в птицеводстве.

Допускается использование в составе премиксов.

Запрещено использование Эймосана одновременно с другими кокцидиостатиками за 7 суток до и в течении 7 суток после применения тиамулина.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо птицы – 5 дней.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат храня при температуре от 0 °С до +30 °С, в защищенном от света и влаги месте.

ГАЛОФУР

Galofurum



Антипротозойный лекарственный препарат

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 0,5 мг галофугинона (в форме лактата).

Препарат выпускают в полимерных флаконах по 100, 500, 1000 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Галофур относится к антипротозойным лекарственным препаратам.

Галофугинон является производным хиназолинона, принадлежащим к группе азотосодержащих полигетероциклов. Обладает антипротозойной активностью в отношении *Cryptosporidium parvum*.

ПОКАЗАНИЯ

Галофур применяют телятам при лечении и профилактике криптоспоридиоза.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Галофур применяют телятам внутрь, индивидуально после кормления, или выпаивают с индивидуальной порцией молока в дозе 2 мл на 10 кг массы тела животного один раз в сутки в течение 7 дней.

С лечебной целью применение препарата необходимо начинать в течение 24 часов после начала диареи, вызванной криптоспоридиями.

Для животных массой менее 35 кг или более 60 кг необходим индивидуальный расчет дозы.

С профилактической целью Галофур применяют телятам в первые 2 суток жизни.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять Галофур ослабленным животным, а также телятам, у которых диарея продолжается более 24 часов. Запрещается задавать лекарственный препарат животным до кормления.

ПРИМЕНЕНИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Сведения о несовместимости препарата с другими лекарственными средствами и кормовыми добавками отсутствуют.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо телят – 15 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

ПРОКОКС

Procoxum



Противоэймериозный лекарственный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 10 мг диклазурила.

Препарат вьшускают в стеклянных флаконах по 100, 400, 450 мл и полимерной упаковке по 500, 1000 и 5000 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Диклазурил является производным бензенацетонитрила и активен в отношении всех видов эймерий, паразитирующих у птиц (кур), в том числе *Eimeria tenella*, *E. necatrix*, *E. mivati*, *E. maxima*, *E. brunetti*, *E. acervulina* и др.; у кроликов *Eimeria flavescens*, *E. intestinalis*, *E. magna*, *E. perforans*, *E. stiedae* и др.; у крупного рогатого скота *E. bovis*, *E. canadiensis*, *E. zuernii*, *E. subspherica* и др.; у овец и коз *Eimeria crandallis*, *E. ovinoidalis*, *E. arloingi*, *E. intricata*, *E. fraurei*; у свиней *Isospora suis*, *Eimeria suis*, *E. debliecki*, *E. scabra*, *E. perminuta* и др.

Механизм действия диклазурила заключается в способности нарушать перенос катионов натрия и кальция в ооцисты эймерий, что приводит к их гибели.

ПОКАЗАНИЯ

Прококс применяют в качестве лечебно-профилактического средства при эймериозе (кокцидиозе) сельскохозяйственных животных и птиц.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах:

- *крупному и мелкому рогатому скоту*, *кроликам*: 0,1 мл на 1 кг массы тела животного с питьевой водой в течение 2 суток;
- *поросятам*: 0,5 мл на 1 кг массы тела животного однократно;
- *птице:* 0,5 мл на 1 л питьевой воды в течение 2 суток.

Птице препарат задают в нерастворенном виде через медикатор или растворяют в воде в соотношении не менее 1 л препарата на 40 л воды.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат не предназначен для применения в ранние периоды беременности и лактирующим самкам.

Препарат запрещается применять птице, чьё яйцо используется в пищу людям, ремонтному молодняку кур старше 16-недельного возраста.

ПРИМЕНЕНИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Препарат совместим со всеми кормовыми добавками, эймериостатиками (кокцидиостатиками) и антибактериальными препаратами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 7 дней. Мясо птицы – 5 дней.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

ТОЛУТРОКС 2,5%

Tolutroxum 2,5%



Антипротозойный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 25 мг толтразурила.

Препарат выпускают в полимерных флаконах по 100, 1000 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Толтразурил относится к группе триазин триона. Активен в отношении всех видов эймерий, паразитирующих у птиц, в том числе: *Eimeria acervulina*, *E. maxima*, *E. tenella*, *E. brunetti*, *E. necatrix*, *E. mitis*, *E. praecox*, *E. adenoeides*, *E. meleagrimitis*, *E. anseris*, *E. truncata* и др.

Толтразурил блокирует дыхательные ферменты и оказывает повреждающее действие на митохондрии и процессы деления ядра эймерий, нарушая процесс формирования макрогаметоцитов, вызывая гибель паразита.

ПОКАЗАНИЯ

Толутрокс 2,5% применяют сельскохозяйственной птице (цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур, индейкам, гусям) с лечебной и профилактической целью при эймериозе.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Птице толутрокс 2,5% применяют два дня подряд в дозе из расчета 1,0 л препарата на 1000 л питьевой воды или в дозе 3000 мл препарата на 1000 л питьевой воды, которую выпаивают птице по 8 часов в сутки два дня подряд.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат запрещен к применению птице, чьё яйцо используется в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Совместим с витаминами, кормовыми добавками и ветеринарными препаратами, применяемыми в птицеводстве.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо цыплят-бройлеров и молодняка кур – 14 суток. Мясо индеек и гусей – 16 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

ТОЛУТРОКС 5%

Tolutroxum 5%

Антипротозойный препарат широкого спектра действия



СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 50 мг толтразурила.

Препарат выпускают в полимерных флаконах по 100, 250, 500, 1000 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Толтразурил относится к группе триазин триона, активен в отношении: *Isospora suis*, *Eimeria arloingi*, *Eimeria scabra*, *Eimeria guevarai*, *Eimeria bovis*, *Eimeria zuernii*, *Eimeria alabamensis* и других видов эймерий, паразитирующих у поросят, ягнят, козлят, телят, кроликов и щенков на стадиях их эндогенного развития.

Толтразурил оказывает повреждающее действие на митохондрии и процессы деления ядра эймерий, нарушая процесс формирования макрогаметоцитов.

ПОКАЗАНИЯ

Толутрокс 5% применяют поросятам, ягнятам, козлятам, телятам, кроликам и щенкам с лечебной и лечебно-профилактической целью при эймериозе.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют перорально индивидуально в следующих дозах:

- *поросятам с 3-дневного возраста:* 0,4 мл на 1 кг массы тела, но не менее 0,5 мл и не более 2 мл на животное, однократно;
- *телятам с 5-дневного возраста:* 3 мл на 10 кг массы животного, однократно;
- *ягнятам и козлятам с 2-недельного возраста:* 4 мл на 10 кг массы животного, однократно;
- *кроликам с 4-недельного возраста:* 0,14 мл на 1 кг массы животного, однократно;
- *щенкам собак с 12-дневного возраста:* 0,2 мл на 1 кг массы животного 1 раз в день в течение 3-х дней.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо поросят – 91 сутки. Мясо ягнят, козлят, телят и кроликов – 70 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

АНТИГЕЛЬМИНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ИНЪЕКЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ

Дормек 106
Левамизол 7,5% 107

ОРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ

Альбендазим 10% 108
Альбендазим 20% 109
Левамизол 100 111
Фенбекс 22,2% 111

ПРОМВЕТСЕРВИС

ДОРМЕК

Dormecum



Противопаразитарный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 10 мг дорамектина.

Препарат выпускают по 10, 20, 50, 100, 200 мл в стеклянных флаконах и по 100 мл в полимерных флаконах.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Дорамектин – новый представитель группы авермектинов. Препарат обладает широким спектром противопаразитарного действия, губительно действуя на нематоды, личинки оводов, чесоточных, иксодовых клещей и насекомых, паразитирующих на животных.

ПОКАЗАНИЯ

Дормек применяют крупному рогатому скоту, овцам и свиньям при гельминтозах, вызываемых нематодами желудочно-кишечного тракта, легких, подкожной клетчатки, слезных протоков; личинками подкожного и носоглоточных оводов, личинками мух, вшами, чесоточными и иксодовыми клещами; при эндо- и эктопаразитозах у кошек и собак.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют однократно, по следующим схемам:

- *крупному рогатому скоту:* 1 мл на 50 кг массы тела животного, подкожно или внутримышечно в области шеи;
- *овцам:* 1 мл на 50 кг массы тела животного, внутримышечно или подкожно в область шеи. В тяжелых случаях чесотки, при хроническом течении заболевания доза препарата – 1,5 мл на 50 кг массы тела животного;
- *свиньям:* 1 мл на 33 кг массы тела животного, внутримышечно у основания уха;
- *кошкам:* 1,0 мл на 10 кг массы тела животного, внутримышечно;
- *собакам:* 0,6 мл на 10 кг массы тела животного, подкожно.

Препарат следует вводить медленно, в холодное время предварительно подогрев до температуры тела животного.

С профилактической целью обработку животных при нематодозах проводят дважды в год: осенью и весной, перед выгоном на пастбище, против оводовых инвазий – сразу после окончания лета, против эктопаразитов – по показаниям.

Перед массовой обработкой животных каждую партию препарата проверяют на небольшой группе животных (по 7-10 голов) разного возраста и упитанности. При отсутствии признаков побочного действия в течение 3 суток после введения препарата, приступают к обработке всего поголовья.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять при повышенной индивидуальной чувствительности животных к компонентам препарата.

С осторожностью применяют препарат парентерально собакам и кошкам (не более 2-х раз с интервалом 10-14 дней, при этом следует тщательно соблюдать дозу препарата).

Запрещается применять собакам породы колли, шелти, бобтейл (возможен летальный исход).

Запрещается применять препарат стельным коровам менее чем за 60 суток и суягным овцам менее чем за 70 суток до предполагаемых родов, истощенным и больным инфекционными болезнями животным.

Запрещено применять препарат продуктивным животным, чье молоко используется в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами не установлено.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо крупного рогатого скота и овец – 70 суток. Мясо свиней – 77 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

ЛЕВАМИЗОЛ 7,5%

Levamisolum 7,5%



Противопаразитарный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 75 мг левамизола гидрохлорида.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50, 100, 200 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Левамизол 7,5% – антигельминтный препарат, включающий в себя левамизола гидрохлорид (соединение из группы имидазолов).

Левамизол активен в отношении желудочно-кишечных и легочных нематод, в том числе *Haemonchus spp.*, *Ostertagia spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Nematodirus spp.*, *Bunostomum spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Cooperia spp.*, *Dictyocaulus spp.*, *Strongyloides papillosus*, паразитирующих у жвачных животных; *Ascaris suum*, *Strongyloides ransomi*, *Metastrongylus spp.*, *Oesophagostomum spp.*, паразитирующих у свиней, *Toxocara spp.*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma spp.*, *Uncinaria spp.*, паразитирующих у собак.

ПОКАЗАНИЯ

Левамизол 7,5% применяют крупному и мелкому рогатому скоту при диктиокаулезе, гемонхозе, буностомозе, эзофагостомозе, нематодирозе, остертагиозе, хабертиозе, кооперіозе, стронгилоидозе; свиньям при аскариозе, эзофагостомозе, стронгилоидозе, трихоцефалезе, метастронгилезе; собакам при токсокарозе, унцинариозе, анкилостомозе и других нематодозах животных.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят однократно без предварительной голодной диеты и слабительных средств в дозах:

- *крупному рогатому скоту*: 1 мл на 10 кг массы тела животного подкожно или внутримышечно. Животным массой более 300 кг вводят не более 30 мл препарата;
- *мелкому рогатому скоту*: 1 мл препарата на 10 кг массы тела животного, подкожно или внутримышечно;
- *свиньям*: 1 мл на 10 кг массы тела животного, подкожно или внутримышечно. Животным массой более 150 кг на каждые 50 кг, превышающие эту массу, дозу препарата увеличивают на 3 мл;
- *собакам*: 1 мл на 10 кг массы тела животного, внутримышечно или внутрь с водой.

В одно место крупному рогатому скоту вводят не более 15 мл, мелкому рогатому скоту – не более 6 мл, свиньям – не более 15 мл.

Перед массовыми обработками каждую новую партию препарата предварительно испытывают на 10-15 животных за 3 дня до основной обработки. При отсутствии осложнений приступают к обработке всего поголовья.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата беременным самкам и животным, больным инфекционными заболеваниями, а также при нарушении функций печени.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не допускается применять препарат одновременно с пирантелом, морантелом и фосфорорганическими соединениями.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо свиней – 28 дней. Мясо коз и овец – 18 дней. Мясо крупного рогатого скота – 14 дней. Молоко – 4 дня.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

АЛЬБЕНДАЗИМ 10%

Albendazimum 10%





Противопаразитарный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 100 мг альбендазола.

Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 500, 1000 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Альбендазол относится к группе бензимидазолов, обладает широким спектром антигельминтного действия.

Эффективен при моно- и полиинвазиях, активен в отношении имаго и личинок нематод, цестод, а также имаго трематод; обладает овоцидным действием, снижает зараженность пастбищ яйцами гельминтов.

ПОКАЗАНИЯ

Альбендазим 10% применяют крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям, лошадям, собакам, прудовым рыбам при гельминтозах.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют без предварительной диеты, однократно, перорально, в смеси с кормом, в следующих дозах:

- *крупному рогатому скоту:* при диктиокаулезе, стронгилятозах желудочно-кишечного тракта, стронгилоидозе – 75 мг препарата на 1 кг массы тела животного; при фасциолезе, парамфистоматидозе – 100 мг препарата на 1 кг массы тела животного; при неоаскариозе – 100 мг препарата на 1 кг массы тела животного, двукратно;
- *овцам:* при фасциолезе, мониезиозе – 75 мг препарата на 1 кг массы тела животного; при диктиокаулезе, стронгилятозах желудочно-кишечного тракта, стронгилоидозе – 50 мг препарата на 1 кг массы тела животного;
- *свиньям:* при аскаридозе, трихоцефалезе, эзофагостомозе, стронгилоидозе, оллуланозе – 75 мг препарата на 1 кг массы тела животного;
- *лошадям:* при параскаридозе, оксиурозе, стронгилятозах – 75 мг препарата на 1 кг массы тела животного;
- *собакам:* при токсаскаридозе, токсокарозе, унцинариозе, цестодозах – 200 мг препарата на 1 кг массы тела животного;
- *прудовой рыбе:* при кавиозе, ботриоцефалезе, лигулезе – 5 кг препарата на 1 т корма методом группового скармливания, 1 раз в день 2 дня подряд (из расчета 5% лечебного корма от массы рыбы).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять препарат животным в случной период, стельным коровам, кобылам в первую треть беременности, суягным овцам и супоросным свиноматкам в первую половину беременности, а также ослабленным, истощенным, при острой форме фасциолеза и больным инфекционными болезнями.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Совместное применение Альбендазим 10% с препаратами, содержащими празиквантел и дексаметазон, приводит к увеличению концентрации альбендазола в крови животного.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 20 дней. Мясо прудовой рыбы – 14 дней. Молоко – 4 дня.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от 0 °С до + 25 °С, в защищенном от света и влаги месте.

АЛЬБЕНДАЗИМ 20%

Albendazimum 20%

Противопаразитарный препарат широкого спектра действия



СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 200 мг альбендазола.

Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 500, 1000 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Альбендазол относится к группе бензимидазолов, обладает широким спектром антигельминтного действия.

Эффективен при моно- и полиинвазиях, активен в отношении имаго и личинок нематод, цестод, а также имаго трематод; обладает овоцидным действием, снижает зараженность пастбищ яйцами гельминтов.

ПОКАЗАНИЯ

Альбендазим 20% применяют крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям, лошадям, собакам при гельминтозах.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют без предварительной диеты, однократно, перорально, в смеси с кормом, в следующих дозах:

- *крупному рогатому скоту:* при диктиокаулезе, стронгилятозах желудочно-кишечного тракта, стронгилоидозе – 37,5 мг препарата на 1 кг массы тела животного; при фасциолезе, парамфистоматидозе – 50 мг препарата на 1 кг массы тела животного; при неоаскариозе – 50 мг препарата на 1 кг массы тела животного, двукратно;
- *овцам:* при фасциолезе, мониезиозе – 37,5 мг препарата на 1 кг массы тела животного; при диктиокаулезе, стронгилятозах желудочно-кишечного тракта, стронгилоидозе – 25 мг препарата на 1 кг массы тела животного;
- *свиньям:* при аскаридозе, трихоцефалезе, эзофагостомозе, стронгилоидозе, оллуланозе – 37,5 мг препарата на 1 кг массы тела животного;
- *лошадям:* при параскаридозе, оксиурозе, стронгилятозах – 37,5 мг препарата на 1 кг массы тела животного;
- *собакам:* при токсаскаридозе, токсокарозе, унцинариозе, цестодозах – 100 мг препарата на 1 кг массы тела животного.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять препарат животным в случной период, стельным коровам, кобылам в первую треть беременности, суягным овцам и супоросным свиноматкам в первую половину беременности, а также ослабленным, истощенным, при острой форме фасциолеза и больным инфекционными болезнями.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Совместное применение Альбендазим 20% с препаратами, содержащими празиквантел и дексаметазон, приводит к увеличению концентрации альбендазола в крови животного.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 20 дней. Молоко – 7 дней.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от 0 °С до + 25 °С, в защищенном от света и влаги месте.

ЛЕВАМИЗОЛ 100

Levamisolum 100



Противопаразитарный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 100 мг левамизола гидрохлорида.

Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 500, 1000 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Левамизол 100 – антигельминтный препарат, включающий в себя левамизола гидрохлорид (соединение из группы имидазолов).

Левамизол активен в отношении желудочно-кишечных и легочных нематод, в том числе *Haemonchus spp.*, *Ostertagia spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Nematodirus spp.*, *Bunostomum spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Cooperia spp.*, *Dictyocaulus spp.*, *Strongyloides papillosus*, паразитирующих у жвачных животных; *Ascaris suum*, *Strongyloides ransomi*, *Metastrongylus spp.*, *Oesophagostomum spp.*, паразитирующих у свиней, *Neoascaris vitulorum*, *Syngamus spp.*, *Heterakis spp.*, *Cappillaria spp.*, *Amidostomum spp.*, паразитирующих у птицы.

ПОКАЗАНИЯ

Левамизол 100 применяют крупному и мелкому рогатому скоту при диктиокаулезе, гемонхозе, буностомозе, эзофагостомозе, нематодирозе, остертагиозе, хабертиозе, кооперіозе, стронгилоидозе; свиньям – при аскариозе, эзофагостомозе, стронгилоидозе, трихоцефалезе, метастронгилезе, птице – при аскаридиозе, капилляриозе, гетеракидозе и других нематодозах животных.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют однократно в следующих дозах:

- *крупному рогатому скоту:* 7,5 г на 100 кг массы тела животного с питьевой водой или кормом;
- *мелкому рогатому скоту:* 0,75 г на 10 кг массы тела животного с питьевой водой или кормом;
- *свиньям:* 1 кг на 1000 л питьевой воды или 1 т корма;
- *сельскохозяйственной птице:* 1 кг на 1000 л питьевой воды.

Перед массовыми обработками каждую новую партию препарата пред-варительно испытывают на 10-15 животных за 3 дня до основной обработки. При отсутствии осложнений приступают к обработке всего поголовья.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не рекомендуется применение препарата истощенным животным и птице, быкам производителям, баранам и хрякам-производителям. Запрещается применять препарат свиноматкам за 14 дней до опороса.

Запрещается применение препарата беременным самкам и животным, больным инфекционными заболеваниями, а также при нарушении функций печени.

Запрещается применять препарат птице, чье яйцо используется в пищу людям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не допускается применять препарат одновременно с пирантелом, морантелом и фосфорорганическими соединениями.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных и птицы – 10 дней. Молоко – 4 дня.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от 0 °С до + 25 °С, в защищенном от света и влаги месте.

ФЕНБЕКС 22,2%

Fenbexum 22,2%



Противопаразитарный препарат широкого спектра действия

СОСТАВ

В 1,0 г препарата содержится 222 мг фенбендазола.

Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 500, 1000 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фенбендазол относится к группе бензимидазолов, обладает широким спектром антигельминтного действия.

Активен в отношении всех фаз развития нематод желудочно-кишечного тракта и легких, трематод, цестод, паразитирующих у крупного рогатого скота, овец и коз: *Haemonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Bunostomum spp., Oesophagostomum spp., Trichuris spp., Strongyloides spp., Dictyocaulus spp., Capillaria spp., Moniezia spp.*; свиней: *Hyostrongylus spp., Oesophagostomum spp., Ascaris suis, Trichuris suis, Metastrongylus spp., Stepharnurus dentatus, Metastrongylus apri*; лошадей: *Strongylus spp., Ascaris spp., Strongyloides spp., Oxyuris spp.*; собак: *Toxocara canis, Toxocara leonine, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, Taenia spp., Oslerus osleri, Giardia spp.*; кошек: *Toxocara mystax, Ancylostoma tubaeforme, Aelurostrongylus abstrusus, Taenia spp.*; а также сельскохозяйственной птицы: *Ascaridia gally, Heterakis gallinarum, Capillariidae spp., Capillaria anseris*.

ПОКАЗАНИЯ

Фенбекс 22,2% применяют для дегельминтизации крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней, собак, кошек, сельскохозяйственной птицы, прудовой рыбы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют без предварительной диеты и слабительных средств, однократно, перорально, в смеси с кормом индивидуально или групповым способом, в следующих дозах:

- *крупному рогатому скоту:* 3,4 г препарата на 100 кг массы тела животного;
- *мелкому рогатому скоту:* 2,3 г препарата на 100 кг массы тела животного;
- *лошадям:* 3,4 г препарата на 100 кг массы тела животного. Для дегельминтизации жеребят при диарее, вызванной нематодой *Strongyloides westeri*, препарат применяют однократно в дозе 50 мг фенбендазола на 1 кг массы тела животного. При инвазии циатостомами, инкапсулированными в слизистой оболочке, препарат применяют в суточной дозе 7,5 мг фенбендазола на 1 кг массы тела животного в течение 5 дней;
- *свиньям:* 2,3 г препарата на 100 кг массы тела животного;
- *собакам, кошкам:* 4,5 г препарата на 10 кг массы тела животного. Допускается применять Фенбекс 22,2% собакам и кошкам в дозе 50 мг фенбендазола на 1 кг массы тела животного 1 раз в день в течение 3 дней;
- *щенкам, котятам (старше 3-недельного возраста):* 2,25 г препарата на 10 кг массы тела животного;
- *сельскохозяйственной птице (при аскаридиозе, гетеракидозе, капилляриозе, смешанной аскаридозно-гетеракидозной инвазии):* 0,45 г препарата на 10 кг массы тела животного;
- *прудовой рыбе* – 5 кг препарата на 1 т корма методом группового скармливания, 1 раз в день 2 дня подряд (из расчета 5% лечебного корма от массы рыбы).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять препарат котятам и щенкам до 3-недельного возраста, а также истощенным и больным инфекционными болезнями животным.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Запрещается применение совместно с другими антигельминтными препаратами группы бензимидазола. Сведения о несовместимости препарата с препаратами других фармакологических групп, кормами и кормовыми добавками отсутствуют.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных, прудовой рыбы – 14 дней. Мясо птицы – 7 дней. Яйцо – 4 дня. Молоко – 4 дня.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от 0 °С до + 25 °С, в защищенном от света и влаги месте.

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ИНЪЕКЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ

Бусерол 113
Гонадерил 114
Дексамет 115
Окситон 116
Преднизол 25 117
Элеопрост D 118
Эстровет DL 119

ПРОМВЕТСЕРВИС

БУСЕРОЛ

Buserolum



Гормональный препарат для регуляции воспроизводительной функции

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 0,004 мг бусерелина (в форме бусерелина ацетата).

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 10, 20, 50 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Бусерелин – синтетический аналог естественного гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ), который стимулирует выделение лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов передней доли гипофиза, рост и созревание фолликулов, синтез и секрецию эстрогенов, вызывает овуляцию и контролирует функцию желтого тела.

ПОКАЗАНИЯ

Бусерол применяют у коров, кобыл, свиней и крольчих для регуляции воспроизводительной функции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят внутримышечно или подкожно в следующих дозах:

- *ремонтным свинкам:*

– для индукции овуляции, с целью проведения однократного искусственного осеменения: 2,5 мл на голову через 115-120 часов после введения последней дозы прогестинов, применяемых для синхронизации половой охоты. Через 30-33 часа после применения препарата, проводят однократное искусственное осеменение;

- *свиноматкам:*

– для индукции овуляции, с целью проведения однократного искусственного осеменения: 2,5 мл на голову через 83-89 часов после отнятия поросят. Через 30-33 часа после применения препарата, проводят однократное искусственное осеменение. Несоблюдение схемы применения препарата и искусственного осеменения может привести к снижению эффективности и нарушению плодовитости животных;

- *крупному рогатому скоту:*

– при персистенции фолликула, задержке овуляции и для повышения оплодотворяемости: 2,5 мл на голову за 1 час до искусственного осеменения;

– для синхронизации половой охоты и овуляции перед проведением искусственного осеменения: 2,5 мл на голову;

– при лечении фолликулярных кист: 5,0 мл на голову, однократно.

Коров, не проявляющих охоту, следует лечить в комбинации с бусеролом в дозе 5 мл на голову, а также возможно лечение в комбинации с прогестогеном;

- *кобылам:*

– для индукции овуляции и повышения оплодотворения (синхронизируя овуляцию ближе ко времени естественного или искусственного осеменения): 10 мл на голову;

- *крольчихам:*

– для индукции овуляции после родов и повышения оплодотворяемости: 0,2 мл на голову.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять препарат животным с индивидуальной повышенной чувствительностью к компонентам препарата.

Запрещается применять препарат животным в период беременности и подсосный период у свиноматок.

Не применять препарат свиноматкам в схеме с другими препаратами, влияющими на репродуктивный цикл, за исключением последовательного применения прогестиновой терапии у ремонтных свинок.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами неизвестно.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Животноводческая продукция – без ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

ГОНАДЕРИЛ

Gonaderilum



Гормональный препарат для стимуляции воспроизводительной функции

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 0,1 мг гонадорелина (в форме гонадорелина ацетата).

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 10, 20, 50 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Гонадорелин – синтетический аналог естественного гонадотропного рилизинг гормона, который синтезируется в гипоталамусе и стимулирует синтез и секрецию лютеинизирующего гормона и фолликулостимулирующего гормона, которые оказывают непосредственное действие на яичники: фолликулостимулирующий гормон стимулирует рост и развитие фолликулов, синтез и секрецию эстрогенов, лютеинизирующий гормон вызывает овуляцию и контролирует функцию желтого тела.

ПОКАЗАНИЯ

Гонадерил применяют для регуляции воспроизводительной функции у крупного рогатого скота, собак и крольчих.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят внутримышечно однократно в следующих дозах:

- *крупному рогатому скоту (коровам и телкам):*

– для индукции овуляции и повышения оплодотворяемости непосредственно перед искусственным осеменением или за 3-4 часа до осеменения: 2,5-5,0 мл/голову;

– для лечения фолликулярных кист яичников: 5,0 мл/голову;

– для синхронизации полового цикла и профилактики кист яичников на 11-14 день полового цикла: 2,5 мл/ голову;

– для нормализации полового цикла в послеродовый период на 20-30 день после отела: 1,0-2,5 мл/голову;

- *крольчихам:*

– для индукции овуляции: 0,2 мл/голову;

сукам:

– для стимуляции овуляции и многоплодия: 0,5-1 мл/голову;

- *кобелям:*

– при крипторхизме, для стимуляции сперматогенеза и половой потенции: 0,5-1 мл/голову, 3-4 раза с интервалом 4-5 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять препарат животным с индивидуальной повышенной чувствительностью к компонентам препарата.

Запрещается применять препарат животным в период беременности.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Применение препарата не исключает использования других лекарственных препаратов для животных.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Животноводческая продукция – без ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

ДЕКСАМЕТ

Dexametum



Противовоспалительный и антиаллергический препарат

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 3 мг дексаметазона.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 20, 50, 100, 200 мл и по 100 мл в полимерных флаконах.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Дексаметазон – синтетический аналог глюкокортикостероидного гормона коры надпочечников – кортизола (гидрокортизона). Оказывает противовоспалительное, десенсибилизирующее, иммунодепрессивное, противошоковое и антитоксическое действие.

Дексаметазон стабилизирует клеточные мембраны, мембраны лизосом, уменьшает проницаемость капилляров, тормозит миграцию нейтрофилов и макрофагов в очаг воспаления и их фагоцитарную активность, угнетает пролиферацию фибробластов и образование коллагена и цитокинов, также ингибирует синтез и нарушает кинетику Т-лимфоцитов, снижает их цитотоксическую активность.

ПОКАЗАНИЯ

Дексамет применяют при артритах, периартритах, тендовагинитах, бурситах, вывихах, миозитах, ушибах; острых инфекционных заболеваниях (в дополнение к средствам этиотропной терапии); аллергических состояниях (астма, аллергические поражения кожи, ламиниты у лошадей и крупного рогатого скота, укусы змей); синдроме ММА у свиней; нарушениях обмена веществ жвачных в последние сроки беременности; шоковых и стрессовых состояниях (коллапс, анафилаксия, травма) и других патологиях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят в качестве противовоспалительного и антиаллергического средства подкожно или внутримышечно в следующих дозах:

- *собакам:* 0,25-0,5 мл препарата на 5 кг массы тела животного;
- *лошадям, крупному рогатому скоту:* 5-10 мл препарата на 400 кг массы тела животного;
- *телятам, овцам, козам:* 1-2 мл препарата на 50 кг массы тела животного;
- *свиньям:* 1 мл препарата на 50 кг массы тела животного.

При необходимости введения можно повторить через 2 дня у собак и через 3-4 дня у других животных.

Индукция родов у коров (в течение 7 дней до родов): 2,5 мл препарата на 100 кг массы тела животного.

Послеродовая токсемия и индукция родов у овец и коз: 6 мл препарата на 50 кг массы тела животного.

Внутрисуставное введение: исходя из зоны поражения и массы животного 0,25-4 мл.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Дексамет противопоказан при диабете, гиперадренокортицизме, остеопорозе, почечной и сердечной недостаточности, беременности (за исключением случаев желаемой индукции родов у жвачных), вирусных заболеваниях, эпилепсии.

Молоко запрещено использовать в пищевых целях в период лечения препаратом и в течение 3 суток после его последнего применения.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Запрещается одновременное введение препарата с вакцинами.

Не рекомендуется применять противогистаминные препараты и барбитураты, т.к. они снижают активность дексаметазона; эстрогены – пролонгируют его действие. Взаимодействие с фуросемидом усиливает гипокалиемию.

Дексаметазон снижает концентрацию в крови салицилатов, уменьшает время анестезии, вызванной барбитуратами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 14 дней. Молоко – 3 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

ОКСИТОН

Oxytonum



Гормональный препарат для стимуляции родовой деятельности и профилактики послеродовых осложнений

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 5 мг пропранолола гидрохлорида.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50, 100, 200 мл и в полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Пропранолола гидрохлорид является неспецифическим β-адреноблокатором. Блокирует β-адренорецепторы миометрия, что способствует проявлению активности эндогенного окситоцина, вследствие чего усиливаются сокращения гладкой мускулатуры матки и молочной железы. Является антагонистом катехоламинов, обладает выраженным антистрессовым действием.

ПОКАЗАНИЯ

Окситон применяют коровам и свиноматкам для стимуляции родовой деятельности, профилактики послеродовых осложнений, при задержании последа, атонии и гипотонии матки, а также в комплексной терапии при послеродовых эндометритах и субинволюции матки, при синдроме метрит-мастит-агалактия у свиноматок, для повышения оплодотворяемости, извлечения эмбрионов у коров-доноров при проведении трансплантации.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят внутримышечно в следующих дозах:

- *коровам*: 10 мл/животное для стимуляции родовой деятельности и профилактики послеродовых осложнений, однократно, в день родов. При применении в комплексной схеме профилактики акушерских заболеваний – на 1-ый, 3-ий и 5-ый дни после родов; при задержании последа – трехкратно с интервалом 12 часов; при субинволюции матки и послеродовых эндометритах – трехкратно с интервалом 24 часа в комплексе с другими препаратами;
- *коровам*: 5 мл/животное при проведении искусственного осеменения для повышения оплодотворяемости, однократно, за 20-30 минут до процедуры; при извлечении эмбрионов у коров-доноров – за 10-15 минут до вымывания;
- *свиноматкам*: 5 мл/животное для стимуляции родовой деятельности и профилактики послеродовых осложнений, однократно в день опороса;
- *свиноматкам*: 5-10 мл/животное для профилактики синдрома «метрит-мастит-агалактия», однократно, сразу после опороса; при комплексном лечении свиноматок, больных синдромом «метрит-мастит-агалактия» – трехкратно с интервалом 24 часа.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Окситон противопоказан в период беременности и при патологических родах.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не допускается одновременное применение с препаратами на основе ксилазина (ксила, ксиланит, рометар, ромпун и др.). Седативные и снотворные препараты при одновременном применении с пропранолоном усиливают угнетающее действие на ЦНС.

При внутривенном и внутримышечном введении йодосодержащих препаратов на фоне введения пропранолола повышается риск развития анафилактических реакций.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Животноводческая продукция – без ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

ПРЕДНИЗОЛ 25

Prednisolum 25



Гормональный препарат противовоспалительного, противоаллергического и противострессового действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 25 мг преднизолона.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 20, 50,100, 200 мл и полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Преднизолон является синтетическим глюкокортикостероидом короткого действия.

Преднизолон влияет на метаболизм углеводов, белков и жиров, стимулирует глюконеогенез. В печени преднизолон усиливает депонирование гликогена, стимулируя активность гликогексинтетазы и синтез глюкозы из продуктов белкового обмена.

Преднизолон тормозит все фазы воспаления, подавляет функции лейкоцитов и тканевых макрофагов; ограничивает миграцию лейкоцитов в область воспаления; нарушает способность макрофагов к фагоцитозу; способствует стабилизации лизосомальных мембран, снижая тем самым концентрацию протеолитических ферментов в области воспаления; уменьшает проницаемость капилляров, обусловленную высвобождением гистамина; подавляет активность фибробластов и образование коллагена.

ПОКАЗАНИЯ

Преднизол 25 применяют при нарушениях обмена веществ (кетоз и токсемия после родов у овцематок и свиноматок); неинфекционных воспалительных процессах (артриты, периартриты, тендовагиниты, бурситы, вывихи, миозиты, растяжения связок). Применяют при острых инфекционных заболеваниях (в комбинации с соответствующими этиотропными средствами), при аллергических состояниях, ламинитах у лошадей и крупного рогатого скота, при укусах змей; стрессовых состояниях; токсемии; шоковых состояниях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводится внутримышечно (желательно в утренние часы) в дозах:

- *крупному рогатому скоту, лошадям:* 4 мл на 250 кг массы тела животного (0,4 мг на 1 кг массы тела животного по ДВ);
- *овцам, козам, свиньям, телятам:* 0,4 мл на 10 кг массы тела животного (0,5-2 мг на 1 кг массы тела животного по ДВ);
- *собакам, кошкам:* 0,1-04 мл на 5 кг массы тела животного (0,5-2 мг на 1 кг массы тела животного по ДВ).

При необходимости препарат вводят повторно через 1 день.

При тяжелой форме неспецифического язвенного колита препарат вводят в течение 5-6 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат противопоказан при сердечной и почечной недостаточности, гиперкортицизме (синдром Кушинга), сахарном диабете, остеопорозе, вирусных заболеваниях; перед плановыми вакцинациями (перед и при).

С осторожностью препарат следует применять беременным животным.

Запрещается применять лактирующим животным.

ПРИМЕНЕНИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не смешивать в одном шприце с другими лекарственными препаратами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 5 дней. Молоко – 3 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

ЭЛЕОПРОСТ D

Eleoprostum D

Гормональный препарат для синхронизации половой охоты



СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 0,075 мг D-клопростенола (в форме натриевой соли).

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 10, 20, 50, 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Элеопрост D относится к группе гормональных лекарственных препаратов и их антагонистов.

D-клопростенол, входящий в состав препарата, является правовращающим оптическим изомером клопростенола – синтетического аналога простогландина F2a.

ПОКАЗАНИЯ

Элеопрост D применяют для синхронизации половой охоты у коров и телок; в схемах лечения коров с лютеиновыми и фолликулярными кистами, персистентным желтым телом, субинволюцией матки и эндометритом и пиометрой; для индуцирования половой охоты и отела у коров; лечения и профилактики функциональных нарушений яичников у свиней, индуцирования и синхронизации опоросов; при нераскрытии шейки матки и выпадении влагалища у овец; прерывания беременности у животных (по показаниям).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Элеопрост D вводят внутримышечно и применяют по показаниям и в дозах, приведенным ниже:

- *синхронизация половой охоты у коров и телок:* вводят 2 мл препарата на животное, двукратно с интервалом 11 дней между введениями. Первую дозу препарата вводят в любую фазу полового цикла (у коров в период с 40 по 60 день после родов). Через 72 ч и 96 ч после второго введения препарата проводят двукратное искусственное осеменение (независимо от внешних признаков половой охоты);
- *индукция половой охоты у коров и телок (также для коров с не выраженными или скрытыми признаками половой охоты):* вводят 2 мл препарата на животное после обнаружения желтого тела (6-18 дни полового цикла), половая охота обычно проявляется в течение 48-60 часов. Поэтому искусственное осеменение необходимо проводить через 72-96 часов после инъекции препарата. Если течка не началась, необходимо повторить инъекцию препарата через 11 дней после первого применения;
- *индукция родов у коров:* вводят 2 мл препарата на животное после 270 дня стельности. Отел должен произойти через 30-60 часов после инъекции;
- *при фолликулярных кистах яичников у коров* вначале вводят подкожно однократно хорионической гонадотропин в дозе 4-5 тыс. ЕД или внутримышечно гонадорелин по 0,5 мг на животное, затем через 11 дней животным, не пришедшим в охоту, вводят 2 мл препарата на животное;
- *коровам с персистентным желтым телом, лютеиновыми кистами яичников:* вводят 2 мл препарата на животное, а искусственное осеменение проводят при первых признаках половой охоты. Если она не наступит, то следует повторно ввести 2 мл препарата на животное через 11 днец после первой инъекции с последующим осеменением через 72-96 ч согласно инструкции;
- *для лечения коров с послеродовым эндометритом, пиометрой:* вводят 2 мл препарата на животное, при необходимости инъекцию препарата повторяют через 10-11 дней;
- *для лечения коров, больных субинволюцией матки*: препарат вводят 2 мл, при необходимости инъекцию препарата повторяют через 24 часа;
- *для восстановления воспроизводительной функции у свиноматок, не проявивших охоту в течение 12 дней после отъема поросят*, препарат вводят в дозе 1мл на животное в сочетании с одним из гонадотропных препаратов (СЖК (сыворотка жеребых кобыл) в дозе 10 МЕ на 1 кг массы тела животного и др.);
- *для синхронизации опороса у свиноматок и профилактики послеродовых заболеваний:* вводят 1 мл на животное, на 113 день супоросности, затем повторяют через 6 часов. В качестве альтернативы, спустя 24 часа после первой инъекции можно ввести стимулятор миометрия, например, окситоцин. При следовании схеме у 70-80% животных роды наступают в интервале 20-30 ч после инъекции окситоцина;
- *для терапии и профилактики нераскрытия шейки матки у суягных овец* вводят 2 мл на животное за 15-16 дней до предполагаемого окота. При выпадении влагалища за 3-5 дней до родов препарат вводят однократно в вышеуказанной дозе в составе комплексной терапии;
- *прерывание нежелательной беременности (по показаниям):* вводят 2 мл на животное.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат противопоказан к применению беременным животным, кроме случаев вынужденного прерывания беременности или индукции родов.

Применение препарата свиноматкам до 113 дня супоросности может негативно повлиять на жизнеспособность и массу новорожденных поросят. Назначают препарат только при точно известной дате осеменения.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не рекомендуется применять препарат животным, которым назначаются нестероидные противовоспалительные препараты.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 24 часа. Молоко – без ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +2 °С до +25 °С, в защищенном от света месте.

ЭСТРОВЕТ DL

Estrovetum DL



Гормональный препарат для профилактики и лечения акушерских и гинекологических патологий

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 0,25 мг клопростенола.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах 10, 20, 50 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Клопростенол, входящий в состав препарата, является синтетическим аналогом простагландина F2α. Обладает специфическим лютеолитическим действием на желтые тела и лютеиновые кисты яичников. Применение препарата в лютеиновой фазе эстрального цикла вызывает регрессию желтого тела, что способствует развитию фолликулогенеза, созреванию фолликулов и синтезу эстрогенов.

ПОКАЗАНИЯ

Эстровет DL применяют для профилактики и лечения акушерских и гинекологических патологий (лютеиновые кисты, персистентное желтое тело, субинволюция матки, эндометрит), при дисфункции яичников, синхронизации полового цикла у самок сельскохозяйственных животных (коровы, свиноматки), для индуцирования и синхронизации опоросов, а также для прерывания беременности при патологии плода.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Эстровет DL вводят внутримышечно и применяют по следующим схемам:

Для индукции полового цикла:

- *коровам и телкам, достигшим физиологической зрелости*: 2 мл/животное. Осеменяют через 72-76 часов. Животных, не пришедших в охоту, обрабатывают повторно в той же дозе через 11 дней, а через 72-96 часов после второго введения препарата осеменяют двукратно без учета появления охоты;
- *свиноматкам, не пришедшим в охоту в течение 10-12 дней после отъема поросят, и ремонтным свинкам, не пришедшим в охоту в течение 30 дней по достижении физиологической зрелости*: 0,7 мл/животное однократно в сочетании с сывороточным гонадотропином в дозе 800-1000 МЕ/животное.

Для синхронизации половой охоты:

- *телкам:* 2 мл/животное. Не пришедших в охоту животных обрабатывают повторно в той же дозе через 11 дней, а через 72-96 часов после второго введения препарата их осеменяют двукратно без учета появления охоты;
- *свиноматкам для синхронизации опороса* однократно 0,7 мл/животное на 113-114-й день супоросности.

При персистентном жёлтом теле яичников:

- *коровам и телкам* однократно 2 мл/животное сразу после постановки диагноза. При проявлении половой охоты проводят двукратное осеменение. При ее отсутствии препарат вводят повторно в той же дозе через 11 дней после первого применения с последующим осеменением через 72-76 и 96 часов.

При лечении коров с лютеиновыми кистами яичников препарат применяют однократно в дозе 4 мл или двукратно с интервалом 24 часа в дозе 2 мл на одно введение.

Для профилактики субинволюции матки и послеродового эндометрита:

- *коровам* однократно 2 мл/животное через 6-12 часов после отела;
- *свиноматкам* однократно 0,7 мл/животное через 2-4 часа после отделения последа.

При эндометрите и субинволюции матки у коров препарат вводят в дозе 2 мл/животное в комплексе со средствами симптоматической терапии.

Для прерывания беременности (при патологии плода и др.) у коров препарат вводят на любой стадии беременности внутримышечно в дозе 2 мл/животное.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат запрещается применять животным в период беременности, за исключением случаев прерывания беременности (по показаниям) или индукции родов.

Запрещено применять при повышенной индивидуальной чувствительности животных к клопростенолу.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 1 сутки. Молоко – без ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 2 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

ВИТАМИНЫ И ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

ИНЪЕКЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ

Визел 121
Користар 122
Феррум+B_{12} 123
Феррум 200 124

ОРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ

Старт Альб 125

ОРАЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ

Селевит Е 126

ПРОМВЕТСЕРВИС

ВИЗЕЛ

Vizelum



Комплексный витаминно-микроэлементный препарат

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержатся 1 мг селена (в форме селенита натрия), 50 мг витами на Е.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 20, 50, 100, 200 мл и в полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Визел – комплексный витаминно-микроэлементный препарат. Введение препарата в организм приводит к быстрому возрастанию уровня витамина Е и селена в организме животных, нормализации обменных процессов.

ПОКАЗАНИЯ

Визел применяют для профилактики и лечения заболеваний, вызванных недостатком витамина Е и селена (беломышечной болезни, травматическом миозите и кардиопатии, токсической дистрофии печени), а также при стрессах и стрессовых ситуациях, нарушениях репродукции и развития плода, задержке роста и недостаточном привесе, инфекционных и инвазионных заболеваниях, профилактических прививках и дегельминтизации, отравлении нитратами, тяжелыми металлами и микотоксинами.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят животным внутримышечно или подкожно в следующих дозах:

- *крупному рогатому скоту:* 5 мл на 100 кг массы тела животного. При необходимости повторить через 5-10 дней. У беременных животных препарат применяется в последнюю треть беременности, при необходимости вторая доза вводится за 30 дней до родов.
- *свиньям:* 5 мл на 100 кг массы тела животного. Свиноматкам препарат применят в указанной дозе в последнюю неделю беременности;
- *телятам:* 2-3,5 мл на 40 кг массы тела животного;
- *поросятам:* 1 мл на 20 кг массы тела животного.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказанием к применению служит индивидуальная повышенная чувствительность животных к селену, либо избыточное содержание селена в кормах и организме (щелочная болезнь).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Совместное применение препарата с витамином С снижает его биодоступность.

Запрещено применение с препаратами мышьяка (химический антагонизм).

Препарат разрушается при взаимодействии с тяжелыми металлами (ртуть, медь, свинец, олово).

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – 10 суток. Молоко – без ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

КОРИСТАР

Coristarum



Комплексный общеукрепляющий и тонизирующий препарат

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 100 мг бутафосфана, 100 мкг цианокобаламина.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 20, 50, 100, 200 мл и в полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Користар – комплексный общеукрепляющий и тонизирующий препарат, нормализует метаболические и регенеративные процессы, оказывает стимулирующее действие на белковый, углеводный и жировой обмен веществ, повышает резистентность организма к неблагоприятным факторам внешней среды, способствует росту и развитию молодняка животных.

ПОКАЗАНИЯ

Користар назначают крупному и мелкому рогатому скоту, лошадям, свиньям, собакам, кошкам при нарушениях обмена веществ различной этиологии, а также в качестве стимулирующего и тонизирующего средства:

- для повышения сопротивляемости организма к заболеваниям различной этиологии;
- как дополнительное средство при лечении заболеваний, обусловленных недостаточностью в организме кальция и магния;
- при родах, а также в целях профилактики послеродовых осложнений (тетания, родильный парез);
- при тяжелых физических нагрузках и повышенной физической активности у спортивных лошадей (за 2-3 дня до соревнований).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Користар применяют 1 раз в сутки внутримышечно или подкожно в течение 4-5 дней по следующим схемам:

- *крупному рогатому скоту, лошадям (взрослое поголовье):* суточная доза 10,0-25,0 мл на животное;
- *молодняку крупного рогатого скота, лошадей:* суточная доза 5,0-12,0 мл на животное;
- *мелкому рогатому скоту (овцам, козам (взрослое поголовье)):* суточная доза 2,5-8,0 мл на животное;
- *молодняку мелкого рогатого скота:* суточная доза 1,5-2,5 мл на животное;
- *свиньям (взрослое поголовье):* суточная доза 2,5-10,0 мл на животное;
- *поросятам-сосунам, подсвинкам:* суточная доза 1,0-2,5 мл на животное;
- *собакам:* суточная доза 0,5-5,0 мл на животное;
- *кошкам:* суточная доза 0,5-2,5 мл на животное.

При хроническом течении болезни назначают ½ суточной дозы препарата.

Повторный курс лечения при необходимости проводят с интервалом 5-14 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять препарат животным с индивидуальной повышенной чувствительностью к его компонентам.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Препарат совместим с другими лекарственными препаратами, применяемыми в животноводстве.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – без ограничений. Молоко – без ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

ФЕРРУМ+B_{12}

Ferrum+B_{12}





Комплексный препарат для профилактики и лечения железодефицитных анемий

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 100 мг комплексно связанного железа и 4 мкг витамина B_{12}.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50, 100, 200 мл и в полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Феррум+B_{12} – комплексный препарат, представляющий собой соединение низкомолекулярного декстрана с железом и витамином B_{12}.

Препарат способствует стимуляции эритропоэза и синтезу гемоглобина, нормализует обменные процессы, ускоряет развитие и повышает резистентность организма.

ПОКАЗАНИЯ

Феррум+B_{12} применяют для профилактики и лечения железодефицитных анемий у животных.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят однократно в следующих дозах:

- *поросятам:* 1,5-2 мл препарата/животное на 3-4 день жизни внутримышечно в область шеи или в область внутренней поверхности бедра;
- *телятам и жеребятам:* 3-6 мл/животное внутримышечно на 3-4 день жизни;
- *крупному рогатому скоту, лошадям:* 4-8 мл/животное, внутримышечно;
- *ягнятам:* 1,5-2,5 мл/животное внутримышечно на 5-6 день жизни;
- *овцам, козам:* 2-3 мл/животное внутримышечно.

При необходимости введение препарата повторяют в тех же дозах через 10 дней.

В зимнее время препарат рекомендуется подогреть на водяной бане до температуры тела животного.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует применять препарат при недостатке витамина Е.

Назначение препарата противопоказано при повышенной чувствительности к препарату, при обработке в течение 10-ти последних дней любыми другими препаратами, содержащими железо.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Препарат несовместим с окситетрациклина гидрохлоридом и сульфадиазином, амфениколами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – без ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

ФЕРРУМ 200

Ferrum 200





Комплексный препарат для профилактики и лечения железодефицитных анемий

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 200 мг комплексносвязанного железа (III), 200 мкг витамина B_{12}.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50, 100, 200 мл, полимерных флаконах по 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Феррум 200 – комплексный препарат, представляющий собой соединение низкомолекулярного декстрана с железом и витамином B_{12}.

Препарат способствует стимуляции эритропоэза и синтезу гемоглобина, нормализует обменные процессы, ускоряет развитие и повышает резистентность организма.

После поступления препарата в ретикулоэндотелиальные клетки, железо освобождается от декстрана и поступает в кровь, где соединяется с трансферрином и разносится по организму, оказывая фармакологический эффект.

ПОКАЗАНИЯ

Феррум 200 применяют для профилактики и лечения железодефицитных анемий у животных.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в следующих дозах:

- *поросятам:* 0,75-1 мл на животное, однократно, на 3-4-й день жизни внутримышечно в область шеи или в область внутренней поверхности бедра;
- *телятам и жеребятам:* 1,5-3 мл на животное, однократно, внутримышечно на 3-4-й день жизни;
- *крупному рогатому скоту, лошадям:* 2-4 мл на животное, однократно, внутримышечно;
- *ягнятам:* 0,75-1,25 мл на животное, однократно, внутримышечно на 5-6-й день жизни;
- *овцам, козам:* 1-1,5 мл на животное, однократно, внутримышечно.

При необходимости введение препарата повторяют в тех же дозах через 10 дней.

В зимнее время препарат рекомендуется подогреть на водяной бане до температуры тела животного.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует применять препарат при недостатке витамина Е. Не применять животным с диареей.

Назначение препарата противопоказано при повышенной чувствительности к препарату, при обработке в течение 10-ти последних дней любыми другими препаратами, содержащими железо, а также совместно с другими железосодержащими препаратами.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Препарат несовместим с окситетрациклина гидрохлоридом и сульфадиазином, амфениколами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – без ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

СТАРТ АЛЬБ

Start Album



Витаминный препарат с высокой биологической активностью

СОСТАВ

В 100 г препарата содержится 6,5 г натрия хлорида, 2,5 г калия хлорида, 500 мг витамина B_3 (никотинамид), 400 мг витамина С (аскорбиновая кислота), 250 мг витамина Е (α-токоферол), 150 мг витамина B_5 (кальция пантотенат), 110 мг витамина B_2 (рибофлавин), 75 мг витамина B_1 (тиамина гидрохлорид), 40 мг витамина B_6 (пиридоксина гидрохлорид), 90 мкг меди.

Старт Альб выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 80, 400, 800 г и в пластмассовых ведрах по 10 кг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Старт Альб способствует поддержанию водно-электролитного баланса в организме, повышает резистентность, стимулирует аппетит, способствует скорейшему восстановлению организма животного, улучшает усвоение важных питательных веществ, стимулирует работу кишечника (может применяться для лечения диареи в комплексной терапии).

ПОКАЗАНИЯ

Старт Альб применяют молодняку крупного рогатого скота и свиней при диареях, для стабилизации водного и электролитного баланса в организме, в период восстановления организма после болезней, для повышения резистентности.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют:

- *телятам:* индивидуально с питьевой водой, в течение 3 дней. Суточная доза в течение первых 2 дней применения – 80 г препарата на 2 литра воды (раствор хорошо перемешивают до полного растворения порошка). Суточная доза делится на 2 части – по 40 г препарата и задается дважды в сутки. На 3-й день применения телят переводят на половинную норму кормления и задают половину суточной дозы препарата (40 г препарата на 1 литр воды), затем переводят на обычный рацион.
- *поросятам:* в дозе 80 г препарата на 2 литра питьевой воды (раствор хорошо перемешивают до полного растворения порошка), в течение 3-5 дней. Во время применения Старт Альб поросята должны получать только воду, содержащую препарат. Для расчета объема лечебного раствора необходимо руководствоваться суточной потребностью поросят в воде, которая соответствует 10% от массы тела. Раствор готовят каждые 24 часа.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Старт Альб совместим со всеми лекарственными средствами и кормовыми добавками.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо животных – без ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от +5 °С до +28 °С, в защищенном от света и влаги месте.

СЕЛЕВИТ Е

Selevitum E



Комплексный витаминно-микроэлементный препарат

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержатся 0,2 мг селена (в форме селенита натрия), 200 мг витамина Е.

Препарат выпускают в полимерной упаковке по 20, 100, 500, 1000, 5000 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Селевит Е – комплексный витаминно-микроэлементный препарат. Введение препарата в организм приводит к быстрому возрастанию уровня витамина Е и селена в организме животных, нормализации обменных процессов.

Препарат укрепляет клетки кровеносных сосудов и миокард. Повышает репродуктивную функцию. Предотвращает токсическое действие свободных радикалов. Способствует выведению токсических веществ из организма.

ПОКАЗАНИЯ

Селевит Е применяют сельскохозяйственным животным, в том числе птице, для профилактики и лечения заболеваний, вызванных недостатком витамина Е и селена.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют в смеси с питьевой водой в течение 3 дней:

- *крупному рогатому скоту:* 3-5 мл на голову в день;
- *телятам, свиноматкам:* 1-2 мл на голову в день;
- *поросятам:* 0,5-1,5 мл на голову в день;
- *сельскохозяйственной птице:* 200-750 мл на 1000 л питьевой воды.

При необходимости доза препарата может быть увеличена в 1,5 раза, а в регионах, дефицитных по содержанию селена – до 5 раз.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказанием к применению служит индивидуальная повышенная чувствительность животных к селену, либо избыточное содержание селена в кормах и организме (щелочная болезнь).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Совместное применение препарата с витамином С снижает его биодоступность.

Запрещено применение с препаратами мышьяка (химический антагонизм).

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо свиней – без ограничений. Мясо птицы – без ограничений. Яйцо – без ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

РАСТВОРЫ ДЛЯ ИНФУЗИЙ

ИНФУЗИОННЫЕ РАСТВОРЫ

Раствор глюкозы 5%. 128
Раствор глюкозы 40% 129
Раствор натрия хлорида 0,9% 130

ПРОМВЕТСЕРВИС

РАСТВОР ГЛЮКОЗЫ 5%

Solutio Glucosi 5%



Плазмозамещающее, регидратирующее, метаболическое и дезинтоксикационное средство

СОСТАВ

В 1 мл препарата содержится 50 мг глюкозы.

Препарат выпускают в стеклянных бутылках по 200, 400 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Глюкоза – это энергетическое и специфическое питательное средство для всех органов и тканей организма.

Глюкоза участвует в различных процессах обмена веществ в организме, усиливает окислительно-восстановительные процессы, улучшает антитоксическую функцию печени, стимулирует синтез гормонов и ферментов в организме животных, повышает защитные силы.

Раствор глюкозы 5%, как изотонический раствор восполняет объем потерянной жидкости, поддерживает объем циркулирующей плазмы.

ПОКАЗАНИЯ

Раствор глюкозы 5% применяют животным (крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, кошки и собаки) для восполнения объёма жидкости при клеточной и общей дегидратации, слабым и истощенным животным как энергетическое и диетическое средство; является компонентом различных кровозамещающих, противошоковых и регидратационных жидкостей, растворителем для лекарственных средств при внутривенном введении с целью ослабления их токсического влияния.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют внутривенно (капельно) 1-2 раза в день в следующих дозах (мл / животное):

- *крупному рогатому скоту:* 600-3000;
- *лошадям:* 600-2400;
- *мелкому рогатому скоту:* 100-600;
- *свиньям:* 200-600;
- *собакам*: 50-500;
- *кошкам:* 5-50.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Гипергликемия, вызванная нарушением функции поджелудочной железы, а также вследствие обильного скармливания углеводистых кормов.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Применение препарата не исключает использования других лекарственных препаратов.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Животноводческая продукция – без ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 30 °С, в защищенном от света месте.

РАСТВОР ГЛЮКОЗЫ 40%

Solutio Glucosi 40%





СОСТАВ

В 1 мл препарата содержится 400 мг глюкозы.

Препарат выпускают в стеклянных бутылках по 200, 400 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Глюкоза – это энергетическое и специфическое питательное средство для всех органов и тканей организма.

При внутривенном введении гипертонического раствора глюкозы повышается осмотическое давление крови, усиливается ток жидкости из тканей в кровь, повышаются процессы обмена веществ, улучшается антитоксическая функция печени и работа сердца, расширяются кровеносные сосуды, усиливается диурез.

Глюкоза стимулирует синтез гормонов и ферментов в организме животных, повышает защитные силы организма.

ПОКАЗАНИЯ

Раствор глюкозы 40% применяют животным (крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, кошки и собаки) при интоксикациях (отравлениях ртутью, мышьяком, синильной кислотой и ее солями, окисью углерода и другими веществами), при заболеваниях печени (гепатиты, циррозы), при отеке легких, декомпенсации сердечной деятельности; при желудочно-кишечных заболеваниях с явлениями интоксикации, гипотонии, атонии преджелудков у жвачных, ацетонемии, послеродовой гемоглобинурии, кетонурии и токсемии у коров, кетонурии у овец и других патологических состояниях, для растворения лекарственных веществ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют внутривенно (капельно) 1-2 раза в день в следующих дозах (мл / животное):

- *крупному рогатому скоту:* 75-370;
- *лошадям:* 75-300;
- *мелкому рогатому скоту:* 10-75;
- *свиньям:* 20-75;
- *собакам:* 5-50;
- *кошкам:* 5-20.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Гипергликемия, вызванная нарушением функции поджелудочной железы, а также вследствие обильного скармливания углеводистых кормов.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Применение препарата не исключает использования других лекарственных препаратов.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Животноводческая продукция – без ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 30 °С, в защищенном от света месте.

РАСТВОР НАТРИЯ ХЛОРИДА 0,9%

Solutio Natrii Chloridi 0,9%



СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 0,9% натрия хлорида.

Препарат выпускают в стеклянных бутылках по 100, 200, 400 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Раствор натрия хлорида 0,9% изотоничен плазме крови животных. Препарат регулирует кислотно-щелочное равновесие организма, проявляет дезинтоксикационные свойства, не оказывает раздражающего действия на ткани. При катаральных процессах препарат разжижает слизь, облегчает ее отделение и тем самым способствует ликвидации воспалительного процесса.

Раствор натрия хлорида 0,9% быстро выводится из сосудистой системы и только временно увеличивает объем жидкости, циркулирующей в сосудах, поэтому при больших кровопотерях и шоке он недостаточно эффективен.

ПОКАЗАНИЯ

Раствор натрия хлорида 0,9% применяют животным (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, лошади, собаки и кошки) при больших потерях организмом жидкости (кровотечения, токсическая диспепсия, состояния после операций), а также при явлениях шока и интоксикации; при воспалительных процессах (вагиниты, метриты, стоматиты). Препарат можно использовать для растворения различных лекарственных веществ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют внутривенно в следующих дозах (мл / животное):

- *крупному рогатому скоту:* 2000-5000;
- *лошадям:* 1000-2500;
- *мелкому рогатому скоту:* 100-300;
- *свиньям:* 100-200;
- *собакам:* 10-200;
- *кошкам:* 5-50.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Гипернатриемия, угроза отека мозга и легких.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Применение препарата не исключает использования других лекарственных препаратов.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Животноводческая продукция – без ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 5 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ИНЪЕКЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ
Коронакэт 132

ПРОМВЕТСЕРВИС

КОРОНАКЭТ

Coronacatum

Противовирусный препарат



СОСТАВ

В 1 мл препарата содержится 10 мг GS 441524.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 10 и 20 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

GS 441524 – противовирусное средство прямого действия для лечения кошек с инфекционным перитонитом (FIP).

ПОКАЗАНИЯ

Коронакэт применяют для лечения вирусного перитонита у кошек (FIP).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют подкожно, 1 раз в сутки в течение 12 недель:

- *при влажной форме вирусного перитонита:* 5-6 мг/кг массы тела по ДВ;
- *при сухой форме вирусного перитонита:* 8 мг/кг массы тела по ДВ;

При отсутствии положительной динамики в лечении или ухудшении клинических признаков (при влажной или сухой форме) можно увеличить дозу до 15 мг/кг массы тела по ДВ.

- *при глазной форме вирусного перитонита:* 10 мг/кг массы тела по ДВ;
- *при неврологической форме вирусного перитонита:* 12 мг/кг массы тела по ДВ.

При отсутствии положительной динамики в лечении или ухудшении клинических признаков (при глазной или неврологической форме) можно увеличить дозу до 20 мг/кг массы тела по ДВ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказанием к применению препарата являются тяжелые нарушения функций почек и печени, повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не рекомендуется одновременное применение препарата с метамизолом, сильными индукторами цитохрома Р 450 (рифампицином и др.) в связи со снижением уровня GS 441524 в крови.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре от + 8 °С до + 25 °С, в защищенном от света месте.

РОДЕНТИЦИДНЫЕ СРЕДСТВА

Комбицид Нео 134

ПРОМВЕТСЕРВИС

КОМБИЦИД НЕО

Combicidum Neo

Родентицидное средство



СОСТАВ

В 1,0 г средства содержится 0,005% бромадиолона.

Комбицид Нео выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 200, 500, 1000 г; мешках полипропиленовых тканых с полиэтиленовым вкладышем по 50, 100, 200, 500, 1000 г и 10, 20 и 25 кг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Бромадиолон – антикоагулянтный яд широкого спектра действия.

Действие бромадиолона основано на торможении протромбина в печении вредителей, а также снижении его концентрации в крови. При попадании в организм бромадиолон замедляет процесс свертывания крови, увеличивает проницательную способность сосудов, приводя тем самым к гибели грызуна от сильного кровотечения.

ПОКАЗАНИЯ

Комбицид Нео применяют для борьбы с мышевидными грызунами (серыми и черными крысами, домовыми мышами, полевками) на объектах ветеринарного надзора.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Комбицид Нео раскладывают в местах обитания грызунов в кормушки или подложки в местах, недоступных для сельскохозяйственных животных, для мышей по 10-30 г, для крыс по 20-50 г. Расстояние между местами раскладки приманки варьирует от 2 м до 15 м, в зависимости от площади помещения, его захламленности, а также вида и численности грызунов. При высокой численности грызунов приманку раскладывают чаще (1-3 м) небольшими порциями.

Поедаемость и состояние разложенной приманки контролируют после первой раскладки через 2 дня, затем – один раз в неделю.

Гибель грызунов наступает на 3-14 сутки после начала поедания ими средства.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Комбицид Нео хранят, с предосторожностью, в защищенном от света и влаги месте в упаковке изготовителя, при температуре от – 20 °С до + 30 °С.